herpy

WARANE

Varanus doreanus

Varanus doreanus ist ein großer, kräftiger Regenwaldwaran aus Neuguinea und dem nördlichsten Australien, mit graublauem Körper und hellblauem, schwarz gebändertem Schwanz. Die Erfahrung mit Haltung und Zucht ist sehr gering, und mehrere Werte sind von nahen Verwandten übernommen.

Familie: Varanidae Englisch: Bluetail monitor Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**100-135 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**300 × 150 × 150 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**26-33 °C**
Sonnenplatz	**40-45 °C**
Temperatur, Nacht	**24-26 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserteil**
Wassertemperatur	**26-28 °C**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten und Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**4-9 Eier**
Inkubation	**164-166 Tage** bei 29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Varanus doreanus braucht ein großes Terrarium mit einem Wasserbecken, in dem er schwimmen und tauchen kann. Die Maße beruhen auf Größe und Lebensweise der Art und auf dem verwandten *Varanus melinus*.

TEMPERATUR

Die Temperaturen für *Varanus doreanus* sind von *Varanus melinus* aus derselben Artengruppe übernommen. Auf Cape York liegt die Tagestemperatur das ganze Jahr über bei 27-33 °C.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Art lebt im Regenwald mit etwa 1.700 mm Regen im Jahr auf Cape York und mehr in Teilen Neuguineas. Halte die Luftfeuchtigkeit wie bei verwandten Regenwaldwaranen bei 60-80 %.

LICHT UND UVB

Die Art ist tagaktiv und nutzt Sonnenplätze, daher wird UVB empfohlen, und Ferguson-Zone 3 passt.

FÜTTERUNG

In der Natur frisst *Varanus doreanus* Reptilien, Eier (besonders Schildkröteneier) und Insekten wie Käfer, vermutlich auch Jungvögel. Im Terrarium eignen sich große Insekten, Mäuse, Fische und Krabben.

VERHALTEN UND UMGANG

Erwachsene Tiere sind kräftig und schnell und können ernsthafte Verletzungen verursachen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Indonesien, Papua-Neuguinea und Australien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/varaner/varanus-doreanus