herpy

WARANE

Krokodilwaran

Varanus salvadorii

Varanus salvadorii ist ein bis zu etwa 250 cm langer, baumbewohnender Waran aus den Regenwäldern Neuguineas mit einem Schwanz, der mindestens doppelt so lang ist wie Kopf und Rumpf, und einem Platzbedarf in der Größe eines Zimmers.

Familie: Varanidae Englisch: Crocodile Monitor Veröffentlicht am 15. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**150-250 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**2.500-6.000 g**
Lebenserwartung	**15-25 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Experte**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**300 × 150 × 200 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**28-32 °C**
Sonnenplatz	**35-40 °C**
Temperatur, Nacht	**24-26 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-90 %**
Wasser	**Wasserteil** Tiefe 30-50 cm
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten und Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**24-60 Monate**
Gelegegröße	**4-12 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-2**
Inkubation	**155-251 Tage** bei 28-30,5 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Die Größe ist die erste Anforderung, die entscheidet, ob die Art vertretbar gehalten werden kann.
TEMPERATUR	*Varanus salvadorii* ist tropisch und tagaktiv und braucht ein großes Temperaturgefälle von etwa 26 °C am kühlen Ende bis zu Sonnenplätzen mit 35-40 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Art braucht hohe Luftfeuchtigkeit, ständig 70-90 %, und gleichzeitig gute Belüftung, damit Bakterien und Pilze keinen Halt finden.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und sonnt sich in den oberen Schichten des Waldes.
FÜTTERUNG	*Varanus salvadorii* ist ein Raubtier, und in der Natur scheinen Vögel die Hauptnahrung zu sein, ergänzt durch kleine Säugetiere, Eier, Insekten und Eidechsen.
VERHALTEN UND UMGANG	*Varanus salvadorii* ist typischerweise nervös und scheu und meidet den Kontakt mit Menschen, und einige Tiere reagieren aggressiv. Jedes Tier hat seinen eigenen Charakter.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Indonesien und Papua-Neuguinea.