herpy

WARANE

Banggai Island monitor

Varanus melinus

Varanus melinus ist ein mittelgroßer, gelber Waran von den Sula-Inseln in Indonesien. Erwachsene Tiere sind kräftig gelb, und die Jungtiere sind schwarz mit gelben Flecken. Die Art braucht ein großes Terrarium mit Wasserbecken und sehr warmen Sonnenplätzen, ernährt sich von Insekten und Wirbeltieren und ist in der Natur gefährdet, daher passt sie nur zu einem erfahrenen Halter.

Familie: Varanidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**90-130 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**8-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**300 × 120 × 150 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**26-33 °C**
Sonnenplatz	**40-45 °C**
Temperatur, Nacht	**24-26 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserteil** Tiefe 80 cm
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten und Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**2-12 Eier**
Inkubation	**164-171 Tage** bei 28-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein einzelnes erwachsenes Tier braucht mindestens 300 × 120 × 150 cm (Länge × Breite × Höhe), und größer ist besser.
TEMPERATUR	Die Hintergrundtemperatur im Terrarium beträgt tagsüber 26-33 °C, und der Sonnenplatz unter den Wärmelampen soll 40-45 °C erreichen, gemessen als Oberflächentemperatur mit einem Infrarotthermometer.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit muss hoch sein, etwa 60-80 % wie bei verwandten Arten aus der Gruppe, zu der *V. indicus* gehört. Sprühe die Jungtiere täglich mit Regenwasser; das Becken trägt ebenfalls zur Feuchtigkeit bei.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und sonnt sich viel. Biete UVB aus Leuchtröhren oder Wärmelampen mit UVB an, damit das Tier seine Dosis wählen kann (Ferguson-Zone 3).
FÜTTERUNG	Die Art ist fleischfressend.
VERHALTEN UND UMGANG	Erwachsene Tiere dieser Größe haben Zähne und Krallen, die tiefe Wunden verursachen können, und der Schwanz ist seitlich zusammengedrückt und kann zum Schlagen verwendet werden.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Indonesien.