herpy

WARANE

Storr's Monitor

Varanus storri

Ein kleiner, flinker, bodenbewohnender Zwergwaran aus Queensland in Australien, der etwa 30 cm lang wird und sich von Insekten ernährt. Er braucht ein langes, warmes Terrarium mit tiefem Bodengrund zum Graben, UVB und Verstecke unter Steinen, und er ist ein Tier zum Beobachten, nicht zum täglichen Anfassen. Die Tiere können mindestens 12 Jahre alt werden.

Familie: Varanidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**25-33 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**12 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Halbwüste und Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**80 × 50 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-30 °C**
Sonnenplatz	**45 °C**
Temperatur, Nacht	**20-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-60 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**2-6 Eier**
Inkubation	**100 Tage** bei 28-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 80 × 50 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe), und ein größeres ist besser. Die Art lebt am Boden, daher zählt die Grundfläche mehr als die Höhe.
TEMPERATUR	Es muss ein großes Temperaturgefälle geben, damit das Tier selbst wählen kann. Das Gefälle sollte von etwa 24 °C am kühlen Ende bis etwa 45 °C am Sonnenplatz reichen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit im Terrarium ist mäßig, etwa 50-60 %. Das Terrarium selbst soll verhältnismäßig trocken sein, aber das Tier muss mindestens eine Stelle mit feuchtem Substrat haben, in die es sich zurückziehen kann, z.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und auf helles Licht und UVB angewiesen. Verwende Tageslichtröhren oder LED-Licht, kombiniert mit einer kräftigen Lichtquelle mit UVB, z.
FÜTTERUNG	*V. storri* ernährt sich überwiegend von Insekten und anderen Wirbellosen. Gib Grillen, Heuschrecken, Schaben und Larven des Riesenmehlkäfers in der Größe, die das Tier leicht fangen kann.
VERHALTEN UND UMGANG	*V. storri* ist schnell und wachsam.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Australien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/warane/varanus-storri