herpy

AGÁMIDOS

Green Pricklenape

Acanthosaura capra

Acanthosaura capra es un agámido de bosque de color verde, con una cresta de largas espinas en la nuca y una espina detrás de cada ojo, originario de los bosques húmedos del sur de Vietnam y el este de Camboya. Alcanza los 25-32 cm, vive en los árboles y necesita un terrario alto, húmedo y relativamente fresco, donde el aire nunca supere los 29 °C.

Familia: Agamidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**25-32 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**100 × 50 × 120 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**22-27 °C**
Punto caliente	**30-32 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**70-90 %**
Agua	**Zona de agua**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**6-15 huevos**
Incubación	**110-180 días** a 25-27 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Casi amenazada (NT)**

Sobre la especie

Acanthosaura capra es un agámido de bosque esbelto, de cuerpo comprimido lateralmente y cola larga y delgada, que supone más de la mitad de la longitud total. El color de fondo va del verde al verde oliva, con un dibujo marrón que difumina el contorno contra la corteza y las hojas. El color cambia con el estado de ánimo, la temperatura y la luz, y con el estrés o por la noche el animal se vuelve marrón. A lo largo de la nuca discurre una cresta de escamas largas y puntiagudas, separada de la cresta dorsal, más baja, y detrás de cada ojo hay una espina bien visible. Las robustas espinas de la nuca y del dorso distinguen a la especie de la emparentada *A. coronata*.

Los adultos miden 25-32 cm incluida la cola, y la hembra es algo mayor que el macho. El macho es más esbelto, tiene la base de la cola más gruesa y un saco gular amarillento que solo muestra cuando se siente amenazado. La especie fue descrita en 1861 por Albert Günther. El nombre procede probablemente del latín *capra*, cabra, por las espinas con forma de cuerno.

El género es difícil de identificar a nivel de especie, y varias especies se venden bajo el mismo nombre comercial, entre ellas *A. lepidogaster*, *A. crucigera* y *A. armata*. Por eso, comprueba qué especie tienes antes de ajustar los cuidados a una guía. La especie prospera a temperaturas más bajas que la mayoría de los agámidos del comercio, y ahí es donde suele fallar el

manejo.

Es diurna y pacífica. Puede volverse tranquila y tomar el alimento de los dedos, pero no es un animal para manipular a diario. Los ejemplares capturados en la naturaleza suelen estar estresados y muy parasitados; los criados en cautividad son claramente preferibles.

Leer más: Comprar animales: cría en cautividad, captura silvestre y transporte

Distribución y hábitat

Acanthosaura capra se encuentra en el sur de Vietnam y el este de Camboya. En Vietnam se conoce, entre otras, de las provincias de Dong Nai, Khanh Hoa y Lam Dong, y en Camboya de la provincia de Mondolkiri. El Parque Nacional de Cat Tien y la reserva natural de Hon Ba son localidades conocidas.

Las citas de Laos son probablemente erróneas. La especie está catalogada como casi amenazada (NT) porque los bosques de la zona se talan para cultivar caucho, mandioca y café.

> **Área de distribución natural:** Camboya y Vietnam.

HÁBITAT

Acanthosaura capra vive en bosque tropical denso y húmedo, a menudo cerca de cursos de agua. Es diurna y vive sobre todo en los árboles, preferentemente en la zona sombreada justo bajo las copas. Allí permanece largos ratos en vertical sobre un tronco, bien camuflada contra la corteza y el follaje, y no busca ni el sol directo ni la lluvia. También baja al suelo para cazar gusanos e insectos, y entra de buen grado en agua corriente para beber y bañarse.

Los bosques son sombríos y húmedos, con temperaturas moderadas, y el animal toma poco el sol. Si lo descubren, huye o se escabulle al otro lado del tronco; solo cuando está acorralado abre la boca y despliega el saco gular.

Cuidados

EL TERRARIO

Un adulto necesita un terrario alto de al menos 100 × 50 × 120 cm (largo × ancho × alto). La altura es más importante que la superficie de la base, porque la especie usa las superficies verticales. Una pareja o un macho con dos hembras necesita bastante más espacio, idealmente 140 × 70 × 170 cm. Una tapa de malla y grandes superficies de ventilación proporcionan el intercambio de aire necesario cuando la humedad es alta.

Amuébralo con muchas ramas y troncos verticales e inclinados, al menos tan gruesos como el cuerpo del animal, placas de corcho o corteza en la pared trasera y plantas vivas y densas como ficus, potos y dracenas, que ofrecen refugio y retienen las gotas. Deja una zona despejada bajo la lámpara de calor. Una zona de agua poco profunda o un recipiente grande y bajo, preferiblemente con una pequeña cascada o goteo, sirve para beber y bañarse. El agua no debe tener más de 10-15 cm de profundidad, para que el animal no se ahogue, y se cambia o se filtra para mantenerla limpia.

El sustrato es una mezcla que retiene la humedad, de tierra de bosque, fibra de coco y algo de arena, sobre una capa de drenaje de bolas de arcilla expandida y una malla de fibra, para que no se acumule agua en el fondo. Debe tener al menos 15-20 cm de profundidad para que la hembra pueda excavar y hacer la puesta. Las cochinillas de la humedad y los colémbolos en el sustrato ayudan a mantenerlo limpio. Retira los excrementos a diario.

Dos machos no deben convivir, porque son territoriales. Ofrece abundantes escondites entre el follaje para que los animales puedan evitarse.

Leer más: Humedad, nebulización y ventilación Leer más: Construcción del terrario y sustrato bioactivo Leer más: Presas vivas: cría y manejo

TEMPERATURA

Acanthosaura capra tolera mal el calor. El aire del terrario debe estar a 22-27 °C durante el día y nunca superar los 29 °C. Si hace más calor durante mucho tiempo, hay riesgo de golpe de calor, estrés y deshidratación. Por eso, coloca el terrario fuera del sol directo y procura que las lámparas no calienten todo el terrario.

Basta una pequeña zona de baño de sol a 30-32 °C, en lo alto de uno de los extremos. La especie toma poco el sol, y lo más importante es una temperatura uniforme y moderada que descienda ligeramente de arriba abajo. Usa una lámpara de calor suave y mide con termómetros digitales tanto en la zona de sol como en la parte baja del terrario. Por la noche la temperatura debe bajar a 18-22 °C; el descenso nocturno es importante para el animal.

En los periodos calurosos del verano, la habitación por sí sola puede calentar demasiado el terrario. Entonces trasládalo a una habitación más fresca, usa un ventilador o apaga la calefacción por completo.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad debe estar en el 70-80 % durante el día y en torno al 90 % o más por la noche. Pulveriza el terrario a fondo con agua blanda 2-3 veces al día, de modo que haya gotas en las plantas y las paredes. Un sistema de lluvia con temporizador mantiene el nivel estable, y un nebulizador por la noche puede aumentar la humedad. Mide con un higrómetro digital en el centro del terrario.

El animal bebe de las gotas y del agua corriente, y a menudo ignora un recipiente de agua estancada. Sin pulverización diaria y un goteo o una cascada, corre el riesgo de deshidratarse y de tener problemas de muda. Al mismo tiempo, el terrario debe poder secarse un poco entre pulverizaciones; de lo contrario aparece moho y el aire se vuelve pesado. Por eso una buena ventilación es tan importante como la humedad.

Leer más: Enfermedades típicas y signos de enfermedad

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna, pero vive a la sombra del bosque y necesita un UVB relativamente débil. Usa un tubo T5 HO del 6 % (zona 2 de Ferguson) en una luminaria reflectante sobre la malla, que cubra aproximadamente la mitad de la longitud del terrario. La rama situada bajo el tubo debe estar a 20-30 cm de él, y la distancia se comprueba con un medidor de UV. El animal siempre debe poder retirarse de la luz entre el follaje.

Complementa con una lámpara LED o T5 de luz diurna para que las plantas prosperen, y enciende la luz 12 horas al día. Los tubos se cambian según las indicaciones del fabricante.

Leer más: Luz y UVB

ALIMENTACIÓN

La especie se alimenta de insectos y otros animales pequeños y le gustan especialmente los gusanos. Ofrece una dieta variada de grillos, cucarachas, saltamontes, gusanos de seda, larvas de mosca soldado, lombrices de tierra y babosas. Los gusanos de la harina, las larvas de la polilla de la cera y los zofobas son grasos y se dan solo de vez en cuando, porque la especie engorda con facilidad. No uses lombrices de compost y recoge animales pequeños de la naturaleza solo en lugares sin pesticidas. La presa no debe ser mayor que la distancia entre los ojos del animal. Come de día y rara vez toma insectos voladores.

Los jóvenes se alimentan a diario con tantos insectos pequeños como puedan comer en 10 minutos. Los adultos se alimentan a diario o cada dos días, con lo que coman en unos 5 minutos. Espolvorea ligeramente los insectos con un suplemento de calcio con algo de D3 y vitaminas, y aliméntalos con verduras y hortalizas durante al menos un día antes de dárselos.

Muchos animales toman el alimento de unas pinzas o directamente de los dedos.

Leer más: Calcio, vitaminas y suplementos

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Acanthosaura capra es un agámido de bosque tranquilo, tímido en la naturaleza, pero que se acostumbra rápido a las personas en el terrario. A menudo permanece completamente quieto sobre una rama o un tronco y rara vez se mueve deprisa. Cuando se asusta, se oscurece, despliega el saco gular o abre la boca. Son signos de estrés y entonces hay que dejarlo tranquilo. Rara vez muerde.

Deja a un animal nuevo 1-2 semanas en paz. Domestícalo estando presente, ofreciéndole alimento de la mano y dejando que se suba a ella en lugar de agarrarlo. Mantén la manipulación breve y poco frecuente, porque el animal se estresa con facilidad al ser sujetado. Lávate las manos con jabón después de cualquier contacto con el animal, el terrario y el alimento, ya que los reptiles pueden portar salmonela.

Mantén a los machos separados, porque son territoriales y pelean. Un macho puede vivir con una o dos hembras en un terrario grande y densamente plantado. Las hembras gestantes pueden volverse agresivas con las demás; en ese caso sepáralas hasta después de la puesta. La especie también se desenvuelve perfectamente en solitario.

Cría

MADUREZ SEXUAL Y SEXADO

La hembra es algo más grande y de cuerpo más ancho, mientras que el macho es más esbelto y tiene la base de la cola más gruesa. El macho tiene un saco gular amarillento y una banda amarillo-verdosa bajo los ojos de la que carece la hembra. En los jóvenes el sexo es difícil de ver y lo determina con más seguridad un veterinario.

Se desconoce la edad de madurez sexual. Pon a una hembra a criar solo cuando esté plenamente desarrollada y en buenas condiciones corporales.

APAREAMIENTO

La cría del género está mejor descrita para la emparentada *A. crucigera* que para *A. capra*, y las cifras sobre el tamaño de la puesta y la incubación se basan en parte en ella.

Un periodo frío en invierno de 6-8 semanas, con días más cortos y unos grados menos de temperatura, pone en marcha la reproducción. Cuando la luz y el calor vuelven a aumentar, los animales están listos para el apareamiento a los pocos días. El macho cabecea desde una rama alta y muestra el saco gular, sigue a la hembra y la sujeta con un mordisco en la nuca durante la cópula. Retira al macho si la hembra sufre heridas o se estresa.

Leer más: Incubación de huevos

PUESTA Y NIDADAS

La hembra hace la puesta aproximadamente un mes después del apareamiento. Unos días antes deja de comer, baja al suelo y hace excavaciones de prueba. El día de la puesta cava un hoyo de hasta 10 cm, deposita los huevos y vuelve a tapar el hoyo. La puesta es de 6-15 huevos.

El sustrato debe tener al menos 15-20 cm de profundidad y estar lo bastante húmedo para que un hoyo excavado se mantenga. Sin un lugar adecuado, la hembra puede retener los huevos, lo que puede provocar una distocia potencialmente mortal. Las hembras también ponen huevos infértiles sin macho. Ofrece a la hembra abundante alimento, calcio y vitaminas antes y después de la puesta.

INCUBACIÓN

Desentierra los huevos con cuidado y colócalos en la misma posición en un recipiente cerrado con vermiculita o perlita húmeda. A 25-27 °C eclosionan a los 110-130 días, pero la incubación puede durar hasta medio año, y una temperatura más baja la alarga.

No gires los huevos y mantén alta la humedad en el recipiente. Comprueba con regularidad si hay moho y retira los huevos infértiles que se hundan o se vuelvan viscosos.

CRIANZA DE LOS JUVENILES

Las crías se trasladan a un terrario de cría con la misma decoración y el mismo clima que el de los adultos: humedad alta, calor moderado, UVB y muchas ramitas y hojas. La zona de agua no debe tener más de 5 cm de profundidad. Las crías pueden crecer juntas en un terrario espacioso, incluso varios machos, pero sepáralas si empiezan a pelear.

Pulveriza a diario y alimenta a diario con grillos pequeños, gusanos pequeños y babosas pequeñas, ligeramente espolvoreados con calcio y vitaminas. Las crías comen mucho y pueden alcanzar unos 15 cm de longitud en un año.

Salud y errores frecuentes

Los animales capturados en la naturaleza suelen estar estresados y muy parasitados, así que un análisis de heces en un veterinario con experiencia en reptiles es lo primero que debe hacerse a un animal nuevo. Los problemas típicos son:

- Golpe de calor y deshidratación por temperatura demasiado alta. El aire no debe superar los 29 °C.
- Problemas de muda y ojos secos por humedad demasiado baja y poca pulverización.
- Enfermedad metabólica ósea por falta de calcio y UVB.
- Infecciones respiratorias y moho si el terrario está húmedo y mal ventilado.
- Obesidad por demasiadas larvas grasas.
- Parásitos internos y ácaros, sobre todo en animales capturados en la naturaleza.
- Distocia en hembras sin un lugar adecuado para excavar. Es potencialmente mortal y requiere veterinario.

Un animal sano tiene los ojos claros, la base de la cola llena y un cuerpo robusto. Respira con la boca cerrada y come con regularidad. Acude al veterinario si el animal pierde peso, deja de comer, permanece en el suelo o respira con la boca abierta.

Pregunta siempre a quien sepa

Esta guía es un buen punto de partida, pero no puede sustituir a la experiencia. Cada animal es distinto, y gran parte de lo más importante se aprende de personas que llevan años criando la especie. Habla con un criador, un aficionado con experiencia o un veterinario que conozca los reptiles y anfibios antes de hacerte con el animal, y otra vez si algo no parece normal.