herpy

AGÁMIDOS

Brown Pricklenape

Acanthosaura lepidogaster

Acanthosaura lepidogaster es una agama de bosque de color gris verdoso a marrón, con una espina detrás de cada ojo y una cresta baja de púas en la nuca. Se distribuye desde el sur de China, pasando por Vietnam y Laos, hasta Tailandia y Myanmar. La especie alcanza 20-28 cm, vive en el matorral y en el suelo del bosque y necesita un terrario húmedo y relativamente fresco, donde el aire no supere los 28 °C.

Familia: Agamidae Nombre anterior: *Acanthosaura lamnidentata; Acanthosaura fruhstorferi; Acanthosaura braueri*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**20-28 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**100 × 50 × 100 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**20-26 °C**
Punto caliente	**28-30 °C**
Temperatura, noche	**18-21 °C**
Humedad	**70-90 %**
Agua	**Zona de agua**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**6-12 huevos**
Incubación	**110-130 días** a 25-27 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un ejemplar adulto necesita un terrario de al menos 100 × 50 × 100 cm (largo × ancho × alto). La especie utiliza tanto las ramas como el suelo, por lo que la superficie de la base es tan importante como la altura.
TEMPERATURA	*Acanthosaura lepidogaster* tolera mal el calor. El aire del terrario debe mantenerse entre 20 y 26 °C durante el día y no debe superar los 28 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad del aire debe situarse en un 70-80 % durante el día y, preferiblemente, en torno al 90 % por la noche.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna, pero vive a la sombra en el bosque y solo necesita UVB débil.
ALIMENTACIÓN	La especie se alimenta de insectos y otros animales pequeños. Ofrece una dieta variada de grillos, cucarachas, saltamontes, gusanos de seda, lombrices de tierra y pequeñas babosas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Acanthosaura lepidogaster* es una agama de bosque tranquila que suele permanecer completamente inmóvil sobre una rama, un tronco o el suelo. Rara vez se mueve con rapidez.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	China, Laos, Myanmar (Birmania), Tailandia y Vietnam.

La guía completa con mapa y actualizaciones: herpy.org/es/agamas/acanthosaura-lepidogaster