herpy

AGÁMIDOS

Green Crested Lizard

Bronchocela cristatella

Bronchocela cristatella es un agámido arborícola de color verde claro y muy esbelto, procedente de los bosques del sudeste asiático, cuya cola supone más de tres cuartas partes de la longitud total. Alcanza 50-58 cm, es de hábitos diurnos y caza insectos en los árboles. Puede pasar de un verde intenso a marrón cuando se inquieta, y es rápida, saltadora y tímida.

Familia: Agamidae Nombre anterior: *Calotes cristatellus; Agama cristatella; Agama moluccana*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**50-58 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 150 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**25-30 °C**
Punto caliente	**32-38 °C**
Temperatura, noche	**22-25 °C**
Humedad	**70-90 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**2 huevos**
Incubación	**47-80 días** a 27-31 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Bronchocela cristatella*.
TEMPERATURA	La temperatura sigue el clima del área de distribución. La temperatura diurna en el terrario debe estar entre 25 y 30 °C, y en una zona de solana alta sobre una rama debe haber 32-38 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad relativa debe mantenerse en 70-90 %, como en un bosque tropical de tierras bajas. Pulveriza el terrario a fondo dos veces al día, de modo que hojas y ramas queden mojadas.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y toma el sol en los bordes del bosque y en claros, por lo que necesita luz intensa y UVB.
ALIMENTACIÓN	*Bronchocela cristatella* se alimenta de insectos que captura en arbustos y árboles, entre ellos garrapatas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es tímida y se estresa con facilidad. Bajo estrés se vuelve marrón y puede huir hacia el follaje o saltar de las ramas. No es apta para manipularla y es un animal para observar.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Brunéi.