herpy

AGÁMIDOS

Dragón de gorguera

Chlamydosaurus kingii

Chlamydosaurus kingii es una agama grande y arborícola del norte de Australia y el sur de Nueva Guinea. Es conocida por la gran gorguera de piel que rodea su cuello y que despliega como defensa amenazante. Mide entre 60 y 90 cm, es diurna y se alimenta de insectos. A cambio, requiere un terrario muy alto, calor intenso y UVB, y es tímida y se estresa con facilidad.

Familia: Agamidae Nombre en inglés: Frilled Lizard Nombre anterior: *Clamydosaurus kingii*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**60-90 cm** longitud total con la cola
Peso	**400-870 g**
Esperanza de vida	**8-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Sabana y bosque seco**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**150 × 75 × 150 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**27-32 °C**
Punto caliente	**38-42 °C**
Temperatura, noche	**23-27 °C**
Humedad	**60-70 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**24-36 meses**
Tamaño de la puesta	**4-20 huevos**
Puestas por año	**2-4**
Incubación	**70-110 días** a 28-29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un ejemplar adulto necesita un terrario de al menos 150 × 75 × 150 cm (largo × ancho × alto).
TEMPERATURA	La zona de asoleo debe estar en la parte superior del terrario y tener una temperatura superficial de 38-42 °C, con unos 40 °C como punto de partida.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe estar entre el 60 y el 70 %, y el terrario debe pulverizarse. La especie vive en un clima con lluvias intensas en verano y bebe gotas de agua.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y toma el sol, por lo que necesita una luz intensa en todo el terrario y una zona de asoleo con luz de calor y UVB.
ALIMENTACIÓN	*Chlamydosaurus kingii* es insectívora. La alimentación consiste en grillos, cucarachas, orugas de mariposa, gusanos de seda y algún gusano de la harina gigante ocasional.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*C. kingii* es tranquila y pasa mucho tiempo quieta en el terrario, pero es tímida ante los movimientos de la habitación.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Australia, Papúa Nueva Guinea y Indonesia.