herpy

AGÁMIDOS

Eyed Butterfly Agama

Leiolepis ocellata

Leiolepis ocellata es una agama terrestre y diurna del norte de Tailandia que excava madrigueras en bosques caducifolios secos, pastizales y campos de cultivo. Se distingue de *Leiolepis belliana* por las grandes manchas en forma de ojo del dorso, y las hembras tienen la garganta roja. La especie necesita un terrario con un sustrato profundo en el que pueda excavar, calor intenso y UVB; en la naturaleza pasa la época fresca dentro de la madriguera.

Familia: Agamidae Nombre anterior: *Leiolepis belliana ocellata*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**35-50 cm** longitud total con la cola
Peso	**45-100 g**
Esperanza de vida	**8-10 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Sabana y bosque seco**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 50 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**26-35 °C**
Punto caliente	**35-37 °C**
Temperatura, noche	**20-25 °C**
Humedad	**40-70 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y plantas**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**3-8 huevos**
Incubación	**55-100 días** a 27-33 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Leiolepis ocellata*.
TEMPERATURA	La zona de asoleo debe tener una temperatura superficial de 35-37 °C. El aire en el extremo cálido está a 30-35 °C y el extremo fresco a 26-29 °C. Por la noche la temperatura baja a 20-25 °C.
HUMEDAD Y AGUA	En la zona de distribución, la humedad del aire oscila entre aproximadamente el 50 % en la época seca y más del 80 % en la época de lluvias. En el terrario son adecuados valores del 40-70 %.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y toma el sol en terreno abierto, por lo que necesita luz intensa y UVB. Usa un tubo o un LED de 6.500 K sobre todo el terrario y un tubo UVB T5 HO del 10-12 % sobre la zona de asoleo.
ALIMENTACIÓN	*Leiolepis ocellata* es omnívora y come insectos y brotes tiernos de plantas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	El animal es tímido y rápido, y huye a una madriguera cuando algo se mueve. Tolera mal la manipulación. Los animales pueden mantenerse solos o en pareja. No se deben juntar dos machos, porque pelean.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Tailandia y Myanmar (Birmania).