herpy

AGÁMIDOS

Chinese Water Dragon

Physignathus cocincinus

Physignathus cocincinus es una agama grande, verde y semiacuática, propia de los cursos de agua de bosque del sudeste asiático. Alcanza unos 90 cm, de los cuales más de dos tercios corresponden a la cola. Es una especie diurna que trepa y se sumerge, y necesita un terrario muy grande, alto y húmedo, con una zona de agua profunda, UVB potente y una zona de reposo al sol bien caliente. Gran parte de los animales que se comercializan son capturados en la naturaleza.

Familia: Agamidae Nombre anterior: *Dilophyrus mentager*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**70-90 cm** longitud total con la cola
Peso	**250-600 g**
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y semiacuático**
Hábitat	**Selva tropical y humedal**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**180 × 90 × 180 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**25-30 °C**
Punto caliente	**35-40 °C**
Temperatura, noche	**21-24 °C**
Humedad	**60-80 %**
Agua	**Zona de agua** profundidad 15-30 cm
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos, plantas y vertebrados**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**5-18 huevos**
Incubación	**60-75 días** a 29-31 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO
Un solo ejemplar adulto necesita un terrario de al menos 180 × 90 × 180 cm (largo × ancho × alto). La especie es grande y activa, trepa y nada, y en un terrario más pequeño se estresa y se lesiona.

TEMPERATURA
La zona de reposo al sol debe estar a 35-40 °C, medidos con un termómetro digital sobre la propia rama. Las crías deben tener una zona de sol en el extremo bajo del intervalo. El aire en el extremo fresco debe estar a 25-28 °C.

HUMEDAD Y AGUA
La humedad ambiental debe ser del 60-80 %, máxima por la mañana (aprox. 75-80 %) y más baja por la tarde (aprox. 50-60 %).

AGUA Y CALIDAD DEL AGUA
La zona de agua debe ser lo bastante grande para que el animal pueda sumergirse y nadar: al menos 15 cm de profundidad, mejor más, y debe cubrir entre un tercio y la mitad del suelo.

ILUMINACIÓN Y UVB
La especie es diurna y necesita UVB potente, equivalente a la zona 3 de Ferguson. Usa un tubo T5 HO con un 10-12 % de UVB en una pantalla reflectante, del mismo lado que las lámparas de calor.

ALIMENTACIÓN
Physignathus cocincinus es omnívora, pero se alimenta sobre todo de insectos. Los ejemplares jóvenes comen casi solo insectos, y con la edad se añaden más vegetales. Crías de menos de 3 meses: grillos pequeños todos los días.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Physignathus cocincinus es tímida y sensible al estrés, sobre todo los ejemplares capturados en la naturaleza.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL
China, Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia.