herpy

AGÁMIDOS

Eastern Bearded Dragon

Pogona barbata

Pogona barbata es una de las agamas barbudas más grandes: una agama robusta y diurna de 50-65 cm, procedente de los bosques y matorrales del este de Australia, con una barba bien desarrollada y oscura y el interior de la boca amarillo. Es más territorial que *Pogona vitticeps*, trepa con facilidad y requiere un terrario grande, mucho calor y UVB.

Familia: Agamidae Nombre anterior: *Agama barbata; Amphibolurus barbatus; Grammatophora barbata; Stellio discosomus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**50-65 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola, terrestre y excavador**
Hábitat	**Sabana y bosque y prado templados**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**180 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**22-37 °C**
Punto caliente	**42-45 °C**
Temperatura, noche	**12-24 °C**
Humedad	**30-60 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y plantas**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**12-24 meses**
Tamaño de la puesta	**15-35 huevos**
Puestas por año	**2-3**
Incubación	**55-75 días** a 28-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	El mantenimiento de *P. barbata* está poco descrito para la propia especie.
TEMPERATURA	Calienta con al menos dos focos halógenos sobre la zona de asoleamiento.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe situarse de media en un 30-60 %, medida en el extremo frío. Varía de forma natural: más baja junto a la zona de asoleamiento, más alta por la noche y cerca del agua.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Pogona barbata* depende de una luz blanca intensa, que favorece el apetito y la actividad. El terrario debe estar muy iluminado y la zona de asoleamiento debe ser el lugar más luminoso.
ALIMENTACIÓN	*P. barbata* es omnívora. En la naturaleza, su alimentación se compone de insectos, gusanos, pequeños vertebrados y partes de plantas. Los jóvenes comen sobre todo insectos y los adultos sobre todo plantas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Pogona barbata* es territorial y lo muestra con más claridad que *Pogona vitticeps*. Una barba negra y desplegada, la boca abierta mostrando el interior amarillo, siseos y un pequeño salto hacia el adversario son amenazas.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Australia.