herpy

AGÁMIDOS

Black-soil Bearded Dragon

Pogona henrylawsoni

Pogona henrylawsoni es el dragón barbudo más pequeño: un agama bajo y compacto, de unos 30 cm como máximo, procedente de las llanuras de suelo negro arcilloso, sin árboles, del centro de Queensland, con una barba poco desarrollada y la cabeza corta y roma. Es diurno y tranquilo, y se conforma con mucho menos espacio que *Pogona vitticeps*, pero tiene las mismas necesidades de calor, UVB potente y un sustrato excavable. Vive entre 10 y 15 años.

Familia: Agamidae Nombre anterior: *Pogona brevis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**25-30 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Semidesierto y sabana**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**90 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-29 °C**
Punto caliente	**38-45 °C**
Temperatura, noche	**13-24 °C**
Humedad	**30-50 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y plantas**
Se mantiene	**En solitario, en pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**12-24 meses**
Tamaño de la puesta	**5-19 huevos**
Puestas por año	**2**
Incubación	**58-64 días** a 29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un solo adulto necesita un terrario de al menos 90 × 45 × 45 cm, y aprovechará más espacio. Un grupo pequeño, por ejemplo un macho con una o varias hembras, requiere al menos 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATURA

La zona de asoleamiento debe tener una temperatura superficial de 38-45 °C, medida con un termómetro infrarrojo sobre la piedra. El extremo frío debe estar a 24-29 °C.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad ambiental debe situarse de media en un 30-50 %, medida en el centro del terrario con un higrómetro digital. Las oscilaciones breves hacia arriba o abajo son inofensivas.

ILUMINACIÓN Y UVB

P. henrylawsoni es diurno y necesita mucha luz blanca y clara y UVB potente. Usa un tubo T5 HO con un 10-12 % de UVB en una pantalla reflectante, en el mismo lado que la lámpara de calor.

ALIMENTACIÓN

P. henrylawsoni es omnívoro y come sobre todo insectos y verduras de hoja. Recién nacidos (menos de 3 meses): insectos 2-3 veces al día y verdura a diario. Jóvenes (3-7 meses): insectos dos veces al día y verdura a diario.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

P. henrylawsoni es tranquilo y tolera una manipulación cuidadosa, pero no le gusta que lo sujeten ni que lo pongan boca arriba, y se debate si ocurre.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Australia.