herpy

AGÁMIDOS

Abrolhos Bearded Dragon

Pogona minima

Pogona minima es un pogona pequeño y diurno que vive únicamente en las islas Wallabi, en Houtman Abrolhos, frente a la costa de Australia Occidental. Mide unos 11 cm del hocico a la cloaca, tiene patas y cola largas y una barba apenas desarrollada. Casi no existen experiencias de mantenimiento, por lo que esta guía se basa en sus parientes más cercanos.

Familia: Agamidae Nombre anterior: *Amphibolurus barbatus minimus; Amphibolurus minimus; Pogona minor minima*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**25-30 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Semidesierto**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-37 °C**
Punto caliente	**40-45 °C**
Temperatura, noche	**13-24 °C**
Humedad	**30-50 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y plantas**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**5-19 huevos**
Incubación	**58-64 días** a 29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**No evaluada (NE)**

Sobre la especie

Pogona minima es un pogona pequeño y esbelto. Los adultos miden unos 11 cm del hocico a la cloaca. La longitud total no está documentada, pero la proporción entre cuerpo y cola en *Pogona minor* permite estimar 25-30 cm. La especie es algo más pequeña que *P. minor* y tiene patas y cola más largas en proporción al cuerpo. La barba es poco marcada y, como en *P. minor*, pequeñas púas erguidas forman una sola hilera a lo largo de los costados.

La taxonomía no está aclarada. La especie fue descrita en 1933 por Arthur Loveridge como subespecie de *Amphibolurus barbatus* y desde entonces se ha tratado sobre todo como subespecie de *P. minor*. También se considera una especie independiente, igual que *Pogona mitchelli*, pero en buena parte de la literatura más reciente ambas formas siguen figurando como subespecies de *P. minor*. Esta guía trata a *P. minima* como especie independiente. El nombre específico *minima* significa en latín «la más pequeña».

El nombre inglés "Western Bearded Dragon" se usa tanto para esta especie como para *Pogona minor*, por lo que resulta impreciso.

Distribución y hábitat

Pogona minima vive únicamente en el grupo Wallabi, en Houtman Abrolhos, un archipiélago de 122 islas situado a unos 80 km al oeste de Geraldton, en Australia Occidental. La especie está registrada en North Wallabi, East Wallabi y West Wallabi. La localidad tipo es West Wallabi. Su distribución se limita, por tanto, a unas pocas islas pequeñas.

En el continente la sustituye *Pogona minor*.

> **Área de distribución natural:** Australia.

HÁBITAT

Las islas tienen un clima mediterráneo semiárido, con veranos cálidos y secos e inviernos más frescos y húmedos. El mar suaviza las oscilaciones: en febrero las temperaturas mínima y máxima diarias son en promedio de unos 19 y 32 °C, y en julio de unos 9 y 20 °C. Caen unos 470 mm de lluvia al año, la mayor parte de abril a septiembre. La vegetación está dominada por arbustos bajos tolerantes a la sal, y la flora se parece a la de la costa continental. *Pogona minima* es diurna y vive en el suelo y en la vegetación baja.

No está documentado qué come la especie ni cómo se reproduce en la naturaleza. Su pariente más cercano, *Pogona minor*, es principalmente insectívoro, y las partes vegetales constituyen aproximadamente una quinta parte de la dieta. Cabe suponer lo mismo aquí.

Cuidados

EL TERRARIO

Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Pogona minima*, y la especie apenas está descrita en cautividad. Las cifras de terrario, temperatura, humedad, iluminación, alimentación y longevidad están tomadas de *Pogona minor* y *Pogona vitticeps*. Australia no permite la exportación de reptiles silvestres, así que los animales fuera del país proceden de antiguas importaciones y de su descendencia.

Un solo adulto necesita un terrario de al menos 120 × 60 × 60 cm, y se aprovecha más espacio si lo hay. El terrario debe estar bien ventilado, con tapa o malla. La superficie del suelo es más importante que la altura, porque la especie vive en el suelo y excava.

Ambienta el terrario con una zona de insolación plana de piedra o madera bajo las lámparas, al menos dos refugios (uno en el extremo cálido y otro en el frío), ramas bajas y pilas estables de piedras planas. El sustrato debe poder excavarse: una capa de al menos 10 cm de arena fina mezclada con tierra vegetal limpia, por ejemplo 60 % de arena y 40 % de tierra. Un sustrato firme, como baldosas sin esmaltar o placas de pizarra, es una alternativa para animales jóvenes y enfermos. La arena de calcio, las cáscaras de nuez trituradas y la corteza no son adecuadas, porque pueden causar obstrucción intestinal si se ingieren. Retira las heces a diario y cambia por completo el sustrato suelto cada 3-6 meses.

Mantén los animales por separado. Los machos son territoriales, y adultos y jóvenes deben estar siempre separados.

Leer más: Humedad, nebulización y ventilación Leer más: Calcio, vitaminas y suplementos

TEMPERATURA

Calienta con al menos dos focos halógenos sobre la zona de insolación. La superficie allí debe estar a 40-45 °C, medida con un termómetro infrarrojo, y la zona caliente debe ser al menos tan grande como todo el animal. El aire del terrario debe estar entre 24 y 37 °C, más cálido en el extremo de la zona de insolación y más fresco en el opuesto. La superficie del extremo frío debe estar a 25-29 °C.

Usa un termómetro infrarrojo para las superficies y un termómetro digital con sonda para el aire, y mide solo cuando las lámparas lleven encendidas unas tres horas.

Por la noche la temperatura puede bajar a 13-24 °C, lo que se corresponde con el clima suave de las islas. Conecta las lámparas a un termostato con la sonda en el extremo frío, de modo que se apaguen si el lado frío supera los 37 °C.

Leer más: Calor y temperatura

HUMEDAD Y AGUA

La humedad ambiental debe estar entre el 30 y el 50 %, medida en el extremo frío, y el terrario debe poder secarse. El aire estancado y húmedo y el sustrato mojado causan enfermedades. Si la humedad es constantemente demasiado alta, ayuda un pequeño ventilador sobre la malla en el extremo frío. Ofrece siempre agua fresca en un recipiente poco profundo. Un refugio ligeramente húmedo en el extremo frío ayuda durante la muda.

ILUMINACIÓN Y UVB

Pogona minima es diurna y necesita una luz blanca intensa. La zona de insolación debe ser el punto más luminoso, y el 75-100 % de la longitud del terrario debería estar iluminado.

El UVB es necesario, y la especie se considera, como las demás del género, de la zona 3 de Ferguson. Usa un tubo T5 HO con un 10-14 % de UVB en una luminaria reflectante sobre el lado caliente, en paralelo a las lámparas de calor. El objetivo es un índice UV de 4,0-4,5 en la zona de insolación, descendiendo a 0 en el extremo frío. Lo ideal es medir con un medidor de UV, porque la distancia depende del tubo, la luminaria y la malla. El cristal y el plástico entre el tubo y el animal bloquean el UVB. Los buenos tubos T5 HO se cambian aproximadamente cada 12 meses. La luz está encendida 12-14 horas al día en verano y unas 10 horas en invierno, controlada por un temporizador.

Leer más: Luz y UVB

ALIMENTACIÓN

Pogona minima se alimenta como *Pogona minor*: sobre todo insectos y una parte menor de vegetales.

- Recién nacidos (menos de 3 meses): insectos 2-3 veces al día y verdura a diario.
- Jóvenes (3-12 meses): insectos y verdura a diario.
- Adultos: insectos 3-5 veces por semana y verdura a diario en una ración pequeña.

Buenos insectos de alimentación son cucarachas dubia, grillos, saltamontes, larvas de mosca soldado negra y gusanos de seda; los gusanos de la harina se dan con moderación. Los insectos no deben ser más grandes que la distancia entre los ojos del animal y deben haber recibido buen alimento durante al menos 24 horas antes de dárselos. Los insectos silvestres pueden estar fumigados y conviene evitarlos.

Como verdura sirven, por ejemplo, rúcula, pak choi, col rizada, diente de león y berro, cortados en tiras pequeñas. El aguacate es tóxico. La fruta es un premio ocasional.

Espolvorea los insectos con calcio. Añade multivitamínico a la ensalada una vez por semana.

Leer más: Presas vivas: cría y manejo

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Pogona minima es diurna y toma mucho el sol. Su lenguaje corporal es el conocido de otros pogonas: cabeceos ante los rivales y saludo con una pata delantera como señal de sumisión. La exhibición de la barba es débil, porque la barba está poco desarrollada.

Deja que un animal nuevo se acostumbre al terrario durante unas dos semanas antes de cogerlo. Ofrece el alimento con unas pinzas y deja la mano quieta dentro del terrario hasta que el animal esté tranquilo. Levántalo sujetando el cuerpo y las patas. Los animales que se esconden o están oscuros y retraídos suelen tener demasiado frío o estar estresados.

Cría

MADUREZ SEXUAL Y SEXADO

No está documentada la edad de madurez sexual. Los machos tienen la cabeza más ancha y los poros femorales más marcados que las hembras. Los animales destinados a la cría deben estar plenamente desarrollados y en buen estado nutricional, y la hembra debe haber recibido abundante calcio.

APAREAMIENTO

El apareamiento y la época de cría no están documentados para *Pogona minima*. En *Pogona minor* se observan hembras gestantes desde mediados de julio hasta finales de diciembre. Da un periodo de reposo fresco en invierno solo a animales sanos y bien nutridos; la duración y la temperatura no se conocen para esta especie. Introduce a la hembra con el macho durante un periodo corto y sepáralos después.

PUESTA Y NIDADAS

El tamaño de la puesta no está documentado para *Pogona minima*. La cifra del recuadro (5-19 huevos) está tomada de *Pogona minor*, y una especie más pequeña probablemente pone menos huevos. Ofrece a la hembra una caja de puesta con una capa de al menos 25 cm de arena húmeda y tierra vegetal que pueda excavar. Una hembra que no encuentra un lugar adecuado puede poner los huevos dispersos por el terrario, donde se secan, o retenerlos; esto último requiere veterinario.

INCUBACIÓN

En *Pogona minor* los huevos eclosionan a los 58-64 días a 29 °C. Las cifras están tomadas de esa especie. Coloca los huevos en una incubadora sobre vermiculita húmeda y no los gires.

Leer más: Incubación de huevos

CRIANZA DE LOS JUVENILES

Las crías son pequeñas y deben mantenerse sobre un sustrato firme, por ejemplo papel de cocina, hasta que coman con fiabilidad. Dales insectos a diario y las mismas condiciones de luz y calor que a los adultos: zona de insolación, UVB y calcio en todo el alimento. Sepáralas por tamaño para que no se muerdan los dedos y las colas.

Salud y errores frecuentes

Los errores de manejo son la causa más frecuente de enfermedad. Los reptiles enfermos ocultan durante mucho tiempo que lo están, así que pesa al animal cada semana y anota el peso, el apetito, las heces y la muda. La lista es válida para los pogonas en general.

- Enfermedad ósea metabólica por poco UVB, poco calcio o temperatura demasiado baja.
- Obesidad y gota úrica por exceso de alimento y poca agua.
- Enfermedad dental y estomatitis.
- Estreñimiento por temperatura demasiado baja, deshidratación o parásitos.
- Parásitos intestinales y ácaros; haz analizar una muestra de heces cuando el animal sea nuevo.
- Huevos que no se ponen, en las hembras.

La pérdida de apetito, la apatía, las articulaciones hinchadas y un animal que deja de comer son motivo para acudir a un veterinario con experiencia en reptiles. Los reptiles suelen portar salmonela, así que lávate las manos después de tocar animales, terrario y material.

Leer más: Enfermedades típicas y signos de enfermedad

Pregunta siempre a quien sepa

Esta guía es un buen punto de partida, pero no puede sustituir a la experiencia. Cada animal es distinto, y gran parte de lo más importante se aprende de personas que llevan años criando la especie. Habla con un criador, un aficionado con experiencia o un veterinario que conozca los reptiles y anfibios antes de hacerte con el animal, y otra vez si algo no parece normal.