herpy

AGÁMIDOS

Western Bearded Dragon

Pogona minor

Pogona minor es un dragón barbudo de tamaño mediano, relativamente esbelto y diurno, de 30-40 cm, del suroeste y el centro de Australia, con solo una barba débil de pequeñas espinas. Vive en dunas, matorrales y bosques secos, come sobre todo insectos y pone varias puestas pequeñas al año.

Familia: Agamidae Nombre anterior: *Amphibolurus minor; Pogona loriae*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**30-40 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Semidesierto y sabana**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-37 °C**
Punto caliente	**40-45 °C**
Temperatura, noche	**13-24 °C**
Humedad	**30-50 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y plantas**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**5-19 huevos**
Puestas por año	**2-4**
Incubación	**58-64 días** a 29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

El cuidado de *P. minor* está poco descrito. Las cifras de terrario, temperatura, humedad, luz, alimento y longevidad están tomadas de *Pogona vitticeps* y de la más pequeña *Pogona henrylawsoni*.

TEMPERATURA

Calienta con al menos dos focos halógenos sobre el lugar de reposo al sol. La superficie allí debe estar a 40-45 °C medidos con un termómetro infrarrojo, y la zona caliente debe ser al menos tan grande como el animal entero.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad del aire debe situarse en el 30-50 %, medida en el extremo fresco, y el terrario debe poder secarse, porque la especie vive en regiones secas. El aire estancado y húmedo y el sustrato mojado provocan enfermedades.

ILUMINACIÓN Y UVB

Pogona minor depende de una luz intensa y blanca, que favorece el apetito y la actividad. El lugar de reposo al sol debe ser el sitio más luminoso, y debe estar iluminado el 75-100 % de la longitud del terrario.

ALIMENTACIÓN

Pogona minor es sobre todo insectívora. En la naturaleza los insectos y otros animales pequeños constituyen aproximadamente el 80 % del alimento y las partes de plantas aproximadamente una quinta parte.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Pogona minor es diurna y toma mucho el sol. El animal usa el lenguaje corporal como otros dragones barbudos: los machos cabecean ante los rivales, y agitar una pata delantera es un signo de sumisión.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Australia.