herpy

AGÁMIDOS

Western Bearded Dragon

Pogona minor

Pogona minor es un dragón barbudo de tamaño mediano, relativamente esbelto y diurno, de 30-40 cm, del suroeste y el centro de Australia, con solo una barba débil de pequeñas espinas. Vive en dunas, matorrales y bosques secos, come sobre todo insectos y pone varias puestas pequeñas al año.

Familia: Agamidae Nombre anterior: *Amphibolurus minor; Pogona loriae*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**30-40 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Semidesierto y sabana**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-37 °C**
Punto caliente	**40-45 °C**
Temperatura, noche	**13-24 °C**
Humedad	**30-50 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y plantas**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**5-19 huevos**
Puestas por año	**2-4**
Incubación	**58-64 días** a 29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Sobre la especie

Pogona minor es un dragón barbudo de tamaño mediano, aplanado y relativamente esbelto. Los adultos miden 10-15 cm del hocico a la cloaca y 30-40 cm en total, y aproximadamente dos tercios de la longitud son cola. Es mucho más pequeño que *Pogona vitticeps* y *Pogona barbata*.

La barba está muy reducida: la garganta solo tiene espinas pequeñas, y la barba casi no se ve cuando el animal amenaza con la boca abierta. Varias espinas pequeñas se disponen en la cabeza, y una hilera regular de escamas espinosas recorre el flanco. El color de fondo es pardo grisáceo con varias manchas grandes más claras y a menudo un dibujo en forma de rombos. La garganta es de gris oscuro a negra, la parte inferior blanco grisácea, y sobre el hombro todos los jóvenes y muchos adultos tienen una mancha oscura. El interior de la boca y la lengua son amarillos. La cola presenta bandas tenues. El aspecto varía de una región a otra: algunas poblaciones tienen el hocico y la cola largos, otras son más compactas, con la cabeza ancha y espinas robustas.

La taxonomía no está resuelta. *Pogona mitchelli*, del noroeste de Australia, y *Pogona minima*, de las islas Houtman Abrolhos, aquí se consideran, como por muchos autores, especies independientes, pero también se tratan como subespecies de *P. minor*. Donde *P. minor* y *P. mitchelli* se encuentran, se cruzan. Esta guía trata de *P. minor* en sentido estricto.

A *P. minor* se le llama a veces dragón barbudo enano, pero ese nombre también se usa para *Pogona henrylawsoni*, y las dos especies son distintas. El nombre de la especie, *minor*, es latín para «menor».

Distribución y hábitat

Pogona minor está extendida por la mayor parte del suroeste y el centro de Australia: desde el sur de Pilbara, el desierto de Little Sandy y el desierto de Gibson, en Australia Occidental, hasta la costa sur y hacia el interior, en los desiertos occidentales de Australia Meridional y del Territorio del Norte. La especie también se encuentra en las islas Barrow, Salutation y Dirk Hartog. La distribución cubre casi un tercio de la parte continental de Australia.

Pogona mitchelli la sustituye en el norte de Australia Occidental y el noroeste del Territorio del Norte, y *Pogona minima* vive solo en las islas Wallabi, en Houtman Abrolhos.

> **Área de distribución natural:** Australia.

HÁBITAT

Pogona minor vive en paisajes cálidos y abiertos: dunas y llanuras costeras, estepa, matorral de tipo sabana, brezal, monte bajo y bosques secos. En la costa prefiere los paisajes de dunas, y en la isla Barrow vive entre la vegetación, sobre todo en matas de hierba *Triodia*. El animal suele tomar el sol en postes de cercas, se posa en ramas y matas y huye corriendo cuando hay peligro.

El alimento se compone sobre todo de animales pequeños: grillos y saltamontes constituyen casi el 30 %, los escarabajos el 17 %, las termitas el 12 %, las larvas de insectos el 8 % y las plantas aproximadamente el 19 %. Es decir, la especie es principalmente insectívora.

La época de cría sigue la latitud. En la parte norte de la distribución los huevos se ponen de julio a septiembre y, al sur del paralelo 30, de octubre a diciembre. Las hembras excavan una cavidad de hasta 25 cm de profundidad, ponen los huevos y la cierran por completo.

Leer más: Presas vivas: cría y manejo

Cuidados

EL TERRARIO

El cuidado de *P. minor* está poco descrito. Las cifras de terrario, temperatura, humedad, luz, alimento y longevidad están tomadas de *Pogona vitticeps* y de la más pequeña *Pogona henrylawsoni*.

Un solo adulto necesita un terrario de al menos 120 × 60 × 60 cm, y se aprovecha más espacio. El terrario debe estar bien ventilado, con tapa o malla.

La especie vive sobre todo en el suelo y excava, así que la superficie del suelo es más importante que la altura. Acondiciona el terrario con un lugar plano de reposo al sol, de piedra o madera, bajo las lámparas, al menos dos refugios (uno en el extremo caliente y otro en el fresco), ramas bajas y pilas estables de piedras planas, para que el animal tenga algo a lo que subir.

El sustrato debe permitir excavar. Una capa de al menos 10 cm de arena fina mezclada con mantillo limpio (por ejemplo, 60 % de arena y 40 % de mantillo) se parece al suelo de la naturaleza. Un suelo firme como baldosas sin esmaltar, placas de pizarra o papel de cocina es una alternativa para animales jóvenes y enfermos. La arena de calcio, la arena con vitaminas, las cáscaras de nuez trituradas y la corteza o las virutas de madera no son adecuadas, porque pueden causar estreñimiento si se ingieren. Retira las heces a diario y cambia por completo el sustrato suelto cada 3-6 meses.

Mantén los animales por separado. Dos machos no deben compartir terrario nunca. Los adultos y los jóvenes deben estar siempre separados.

Leer más: Humedad, nebulización y ventilación Leer más: Calcio, vitaminas y suplementos

TEMPERATURA

Calienta con al menos dos focos halógenos sobre el lugar de reposo al sol. La superficie allí debe estar a 40-45 °C medidos con un termómetro infrarrojo, y la zona caliente debe ser al menos tan grande como el animal entero. El aire del terrario debe situarse en 24-37 °C, más caliente en el extremo del lugar de reposo y más fresco en el opuesto. La superficie del extremo fresco debe estar a 25-29 °C.

Usa un termómetro infrarrojo para las superficies y un termómetro digital con sonda para el aire, y mide solo cuando las lámparas lleven encendidas unas tres horas. Las bombillas halógenas dan calor infrarrojo de onda corta, como el sol. Si el lugar de reposo está demasiado frío, acércalo a la lámpara.

De noche la temperatura puede bajar a 13-24 °C. Un descenso nocturno hace que el animal tome el sol antes por la mañana. Conecta las lámparas a un termostato con la sonda en el extremo fresco, para que se apaguen si el lado fresco supera los 37 °C.

Leer más: Calor y temperatura

HUMEDAD Y AGUA

La humedad del aire debe situarse en el 30-50 %, medida en el extremo fresco, y el terrario debe poder secarse, porque la especie vive en regiones secas. El aire estancado y húmedo y el sustrato mojado provocan enfermedades. Si la humedad es constantemente demasiado alta, ayuda un pequeño ventilador sobre la malla en el extremo fresco. Una humedad demasiado baja causa deshidratación y problemas con la muda.

Ofrece siempre agua fresca en un recipiente poco profundo. El animal obtiene parte de su agua a través del alimento, así que la verdura aclarada que ha estado en agua ayuda. Una ducha ligera sobre el acondicionamiento da gotas que el animal puede lamer. Un refugio ligeramente húmedo en el extremo fresco ayuda durante la muda.

ILUMINACIÓN Y UVB

Pogona minor depende de una luz intensa y blanca, que favorece el apetito y la actividad. El lugar de reposo al sol debe ser el sitio más luminoso, y debe estar iluminado el 75-100 % de la longitud del terrario.

El UVB es necesario, y la especie, como las demás del género, pertenece a la zona 3 de Ferguson. Usa un tubo T5 HO con un 10-14 % de UVB en una luminaria reflectante sobre el lado caliente, en paralelo a las lámparas de calor. El objetivo es un índice UV de 4,0-4,5 en el lugar de reposo al sol, que baje a 0 en el extremo fresco. La distancia entre el tubo y el lugar de reposo depende del tubo, la luminaria y la malla, así que conviene medir con un medidor de UV. El vidrio y el plástico entre el tubo y el animal bloquean el UVB. Los buenos tubos T5 HO se cambian al cabo de unos 12 meses, aunque sigan luciendo.

Todavía no se considera seguras para los reptiles las lámparas LED con UVB. La luz está encendida 12-14 horas al día en verano y unas 10 horas en invierno, controlada por un temporizador.

Leer más: Luz y UVB

ALIMENTACIÓN

Pogona minor es sobre todo insectívora. En la naturaleza los insectos y otros animales pequeños constituyen aproximadamente el 80 % del alimento y las partes de plantas aproximadamente una quinta parte.

- Recién nacidos (menos de 3 meses): insectos 2-3 veces al día y verdura a diario.
- Jóvenes (3-12 meses): insectos y verdura a diario.
- Adultos: insectos 3-5 veces por semana y verdura a diario, pero solo una ración pequeña.

Buenas presas son las cucarachas dubia, los grillos, los saltamontes, las larvas de mosca soldado negra y los gusanos de seda; los tenebrios se dan con moderación. Los insectos no deben ser mayores que la distancia entre los ojos del animal y deben haber recibido buen alimento durante al menos 24 horas antes de dárselos. Los insectos silvestres pueden haber sido fumigados o ser tóxicos y deben evitarse.

La verdura incluye, por ejemplo, rúcula, pak choi, col rizada, hojas de mostaza, diente de león, berro y hojas de cactus, cortadas en tiras pequeñas. El aguacate es tóxico. La fruta es una golosina ocasional.

Espolvorea los insectos con calcio. Espolvorea multivitamínico sobre la ensalada una vez por semana.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Pogona minor es diurna y toma mucho el sol. El animal usa el lenguaje corporal como otros dragones barbudos: los machos cabecean ante los rivales, y agitar una pata delantera es un signo de sumisión. La exhibición de la barba es débil, porque la barba está muy reducida.

Deja que un animal nuevo se acostumbre al terrario durante unas dos semanas antes de cogerlo. Dale de comer con unas pinzas y deja la mano quieta en el terrario hasta que el animal esté tranquilo. Levántalo apoyando el cuerpo y las patas, y muévete despacio. Los animales que se esconden o están oscuros y retraídos suelen estar demasiado fríos o estresados.

Mantén los animales de forma individual. Los machos son territoriales, y los animales que comparten terrario se disputan el rango y el lugar de reposo al sol.

Cría

MADUREZ SEXUAL Y SEXADO

Las hembras alcanzan la madurez sexual con una longitud del hocico a la cloaca de unos 9 cm. No se ha documentado la edad. Los machos tienen la cabeza más ancha y los poros femorales más marcados que las hembras. Los animales destinados a la cría deben ser adultos plenos y estar en buen estado, y la hembra debe haber recibido calcio en abundancia.

APAREAMIENTO

En la naturaleza se ven hembras gestantes desde mediados de julio hasta finales de diciembre, antes en el norte. Los machos cabecean ante los rivales y las hembras, y las hembras agitan una pata delantera. Da un periodo de reposo fresco en invierno solo a animales sanos y bien alimentados, para ponerlos en disposición de aparearse; no se conocen la duración ni la temperatura para la especie. Introduce a la hembra con el macho durante un breve periodo y sepáralos después.

PUESTA Y NIDADAS

Una hembra pone 5-19 huevos por puesta, 8 de media, y hace al menos dos y hasta cuatro puestas por temporada. El tamaño de la puesta no depende del tamaño de la hembra. La puesta pesa entre una quinta parte y un tercio del peso de la hembra, así que debe recibir abundante calcio y alimento. Los huevos miden 20-25 mm de largo y 12-14 mm de ancho y pesan unos 2 g.

Ofrece a la hembra una caja de puesta con una capa de al menos 25 cm de arena húmeda excavable y mantillo. Una hembra que no encuentra un lugar adecuado puede poner los huevos dispersos por el terrario, donde se secan, o retenerlos; esto último es una urgencia que requiere un veterinario.

INCUBACIÓN

Los huevos eclosionan a los 58-64 días a 29 °C y a los 100-109 días a 25 °C. El tiempo de incubación varía y, a 28 °C, los huevos pueden eclosionar ya a los 51 días. Colócalos en una incubadora en vermiculita húmeda (algo más de agua que de vermiculita en peso) y no los gires. Tanto a 25 como a 29 °C eclosionan machos y hembras. Las crías de 29 °C tienen la cola aproximadamente un 17 % más larga que las de 25 °C.

Leer más: Incubación de huevos

CRIANZA DE LOS JUVENILES

Las crías pesan unos 2 g y miden 9-10 cm (unos 4 cm del hocico a la cloaca). Mantenlas sobre suelo firme, por ejemplo papel de cocina, hasta que coman de forma fiable, y dales insectos a diario. Necesitan la misma luz y calor que los adultos: lugar de reposo al sol, UVB y calcio en todo el alimento. Sepáralas por tamaño, para que no se muerdan los dedos y las colas.

Salud y errores frecuentes

Los errores de cuidado son la causa más frecuente de enfermedad. Los reptiles enfermos disimulan mucho tiempo que lo están, así que pesa al animal cada semana y anota el peso, el apetito, las heces y la muda. La lista es válida para los dragones barbudos en general.

- Enfermedad metabólica ósea por falta de UVB, falta de calcio o temperatura demasiado baja.
- Obesidad y gota úrica por demasiado alimento y poca agua.
- Enfermedad dental y estomatitis.
- Estreñimiento por temperatura demasiado baja, deshidratación o parásitos.
- Parásitos intestinales y ácaros; haz analizar una muestra de heces cuando el animal sea nuevo.

- Huevos que no se ponen, en las hembras.

La pérdida de apetito, el letargo, las articulaciones hinchadas, la respiración con la boca abierta sin que el animal tenga calor y un animal que deja de comer son motivo para acudir a un veterinario con experiencia en reptiles. Los reptiles suelen portar salmonela, así que lávate las manos después de tocar el animal, el terrario y el equipo, y mantén al animal y sus cosas lejos de la cocina.

Leer más: Enfermedades típicas y signos de enfermedad Leer más: Hibernación y estaciones

Pregunta siempre a quien sepa

Esta guía es un buen punto de partida, pero no puede sustituir a la experiencia. Cada animal es distinto, y gran parte de lo más importante se aprende de personas que llevan años criando la especie. Habla con un criador, un aficionado con experiencia o un veterinario que conozca los reptiles y anfibios antes de hacerte con el animal, y otra vez si algo no parece normal.