herpy

AGÁMIDOS

North-African Mastigure

Uromastyx acanthinura

Uromastyx acanthinura es un uromastix robusto de las zonas pedregosas y de grava del norte del Sáhara. Alcanza 30-43 cm, pesa unos 450 g, excava madrigueras profundas y se alimenta sobre todo de plantas. Requiere un terrario grande, cálido y seco, con sustrato profundo y UVB potente, y puede vivir más de 20 años. Es una especie territorial y se mantiene en solitario.

Familia: Agamidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**30-43 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15-24 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Rupícola, terrestre y excavador**
Hábitat	**Desierto, semidesierto y terreno rocoso**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**27-32 °C**
Punto caliente	**50-55 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**20-30 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Reposo invernal	**16-22 °C** 8-12 semanas
Alimentación	**Plantas**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**48 meses**
Tamaño de la puesta	**6-23 huevos**
Puestas por año	**1**
Incubación	**56-84 días** a 33-34 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Casi amenazada (NT)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un adulto necesita un terrario de al menos 120 × 60 × 60 cm (largo × ancho × alto), y cuanto mayor, mejor, por ejemplo 150 × 60 × 60 cm para un ejemplar grande. Los terrarios de cristal habituales son demasiado pequeños.
TEMPERATURA	La zona de insolación debe tener una temperatura superficial de 50-55 °C, medida con un termómetro infrarrojo justo bajo la lámpara. El lado frío debe estar a 27-32 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad del terrario debe ser baja: alrededor del 20-30 %, medida a nivel del suelo en el lado frío. La humedad alta y constante enferma al animal, así que no pulverices el terrario.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y necesita luz intensa. Además de la lámpara de calor, usa una lámpara LED o un tubo fluorescente de unos 6500 K como luz diurna.
ALIMENTACIÓN	Los adultos son casi exclusivamente herbívoros.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es marcadamente territorial: ambos sexos defienden su territorio y en las peleas los animales se muerden en los flancos, con lo que pueden aparecer cicatrices blancas.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Argelia, Túnez y Libia.