herpy

AGÁMIDOS

Egyptian Spiny-tailed Lizard

Uromastyx aegyptia

Uromastyx aegyptia es la mayor de las uromastyx: un lagarto del desierto, pesado y herbívoro, procedente de Egipto, Oriente Medio y la península arábiga, que puede alcanzar los 76 cm y pesar 2,5 kg. Excava madrigueras profundas, toma el sol bajo un calor intenso y necesita un terrario muy grande y seco con UVB potente. La especie es vulnerable en la naturaleza y solo es adecuada para un cuidador experimentado con mucho espacio.

Familia: Agamidae Nombre anterior: *Stellio spinipes; Uromastyx leptieni; Uromastyx microlepis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**40-76 cm** longitud total con la cola
Peso	**1.000-2.500 g**
Esperanza de vida	**15-30 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Desierto y semidesierto**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**240 × 120 × 120 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**27-32 °C**
Punto caliente	**50-55 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**20-30 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Reposo invernal	**16-22 °C** 8-12 semanas
Alimentación	**Plantas**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**6-23 huevos**
Incubación	**56-84 días** a 33-34 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Vulnerable (VU)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un adulto necesita un terrario de al menos 240 × 120 × 120 cm (largo × ancho × alto).
TEMPERATURA	La zona de sol debe tener una temperatura superficial de 50-55 °C, medida con un termómetro infrarrojo justo debajo de la lámpara. El lado fresco se sitúa entre 27 y 32 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe ser baja, de alrededor del 20-30 %, medida a nivel del sustrato en el lado fresco. Una humedad alta mantenida enferma al animal, así que no pulverices el terrario.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y necesita luz intensa. Usa una lámpara LED grande o varios tubos fluorescentes de unos 6500 K como luz diurna, separados de la fuente de calor; los animales están más activos y comen mejor con ella.
ALIMENTACIÓN	*Uromastyx aegyptia* es herbívora. Alrededor del 90 % del alimento debe ser verdura de hoja y flores, aproximadamente un 5 % hortalizas duras y otro 5 % alimento seco.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los adultos son tranquilos y sedentarios, pero territoriales con otros de su especie, sobre todo los machos entre sí. Mantenlos por separado.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Egipto, Israel, Jordania, Siria, Irak, Irán, Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen.