herpy

AGÁMIDOS

Sudan Mastigure

Uromastyx dispar

Uromastyx dispar es un uromastyx del Sáhara y el Sahel con cuatro subespecies, entre ellas la grande *U. d. flavifasciata* y la muy frecuente en cautividad *U. d. maliensis*, de Mali. La especie alcanza 28-50 cm según la forma, es herbívora y excava en un sustrato profundo. Necesita un terrario grande, cálido y seco con UVB potente, y es más un animal para observar que para manipular.

Familia: Agamidae Nombre anterior: *Uromastyx flavifasciata; Uromastyx maliensis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**28-50 cm** longitud total con la cola
Peso	**200-400 g**
Esperanza de vida	**15-25 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Rupícola, terrestre y excavador**
Hábitat	**Desierto y terreno rocoso**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**29-35 °C**
Punto caliente	**45-50 °C**
Temperatura, noche	**20-22 °C**
Humedad	**20-30 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Reposo invernal	**18-21 °C** 8-12 semanas
Alimentación	**Plantas**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**36 meses**
Tamaño de la puesta	**10-20 huevos**
Puestas por año	**1**
Incubación	**60-80 días** a 33 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un ejemplar adulto de la forma nominal o de *U. d. maliensis* necesita un terrario de al menos 120 × 60 × 60 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande, mejor.
TEMPERATURA	La zona de asoleo debe tener una temperatura superficial de 45-50 °C, medida con un termómetro infrarrojo justo debajo de la lámpara. El centro del terrario está a 35-38 °C y el extremo fresco a 29-35 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe ser inferior al 30 %. La especie tolera una humedad algo mayor mientras el terrario esté lo bastante seco y cálido, pero no tolera estar fría y húmeda. No pulverices el terrario.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y necesita una luz intensa. Además de la lámpara de calor, usa una lámpara LED o un tubo fluorescente de unos 6500 K como luz diurna.
ALIMENTACIÓN	*Uromastyx dispar* es herbívora.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los adultos son territoriales, sobre todo los machos con otros machos, y nunca deben mantenerse dos machos juntos.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Argelia, Sáhara Occidental, Mali, Mauritania, Sudán y Chad.