herpy

AGÁMIDOS

Moroccan Spiny-tailed Lizard

Uromastyx nigriventris

Uromastyx nigriventris es un uromastix robusto y colorido de los desiertos pedregosos al este y al sur del Atlas, en Marruecos, y en el oeste de Argelia. Los adultos suelen tener una coloración de fondo negra con dibujos amarillos, verdes y naranjas. Alcanza hasta 42 cm, se alimenta casi exclusivamente de plantas y excava madrigueras profundas. Necesita un terrario grande, cálido y seco, con un sustrato profundo y una iluminación UVB potente, y se mantiene en solitario.

Familia: Agamidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**30-42 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15-25 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Rupícola, terrestre y excavador**
Hábitat	**Desierto, semidesierto y terreno rocoso**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**27-32 °C**
Punto caliente	**50-55 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**20-30 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Reposo invernal	**16-22 °C** 8-12 semanas
Alimentación	**Plantas**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**48 meses**
Tamaño de la puesta	**10-15 huevos**
Incubación	**56-84 días** a 33-34 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un adulto necesita un terrario de al menos 120 × 60 × 60 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande, mejor.

TEMPERATURA

La zona de insolación debe tener una temperatura superficial de 50-55 °C, medida con un termómetro de infrarrojos justo debajo de la lámpara. El lado frío se sitúa en 27-32 °C.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad ambiental debe ser baja, del 20-30 %, medida a nivel del suelo en el lado frío. Una humedad alta y sostenida enferma al animal, así que no pulverices el terrario.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y necesita una luz intensa. Usa una lámpara LED o un tubo fluorescente de unos 6500 K como luz diurna, separada de la fuente de calor.

ALIMENTACIÓN

Uromastyx nigriventris es herbívoro. Alrededor del 90 % del alimento debe ser hojas verdes y flores, aproximadamente un 5 % verduras duras y aproximadamente un 5 % alimento seco.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Los adultos son territoriales, y en la naturaleza solo vive un adulto en cada montón de piedras. Por eso, mantén el animal en solitario.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Marruecos y Argelia.