herpy

AGÁMIDOS

Ocellated Spinytail

Uromastyx ocellata

Uromastyx ocellata es una uromastix pequeña y compacta de los desiertos rocosos del sur del mar Rojo. El dorso está adornado con ocelos claros y el macho es más colorido que la hembra. La especie alcanza 25-30 cm, es herbívora y excava en un sustrato profundo y seco. Necesita un terrario cálido y seco con UVB potente, y se confunde con facilidad con sus parientes más cercanos.

Familia: Agamidae Nombre anterior: *Uromastyx ocellatus; Aporoscelis princeps*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**25-30 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15-25 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Rupícola, terrestre y excavador**
Hábitat	**Desierto, semidesierto y terreno rocoso**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**27-32 °C**
Punto caliente	**50-55 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**20-30 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Plantas**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**36-60 meses**
Tamaño de la puesta	**4-20 huevos**
Incubación	**60-70 días** a 33-34 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO
Un adulto necesita un terrario de al menos 120 × 60 × 60 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande, mejor.

TEMPERATURA
La zona de sol debe tener una temperatura superficial de 50-55 °C, medida con un termómetro infrarrojo justo debajo de la lámpara. El lado frío está a 27-32 °C.

HUMEDAD Y AGUA
La humedad ambiental debe ser baja, de aproximadamente 20-30 %, medida junto al sustrato en el lado frío. Una humedad alta mantenida enferma al animal, así que no pulverices el terrario.

ILUMINACIÓN Y UVB
La especie es diurna y necesita una luz potente. Usa una lámpara LED o un tubo fluorescente de unos 6500 K como luz diurna, separada del calor; los animales están más activos y comen mejor con ella.

ALIMENTACIÓN
Uromastyx ocellata es herbívora. Alrededor del 90 % del alimento debe ser verdura de hoja y flores, aproximadamente un 5 % hortalizas duras y un 5 % alimento seco.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Los adultos son tranquilos y sedentarios, pero territoriales con otros de su especie, sobre todo los machos con otros machos. Mantenlos de forma individual.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL
Egipto, Sudán, Eritrea, Yibuti, Etiopía y Somalia.