herpy

ÁNGUIDOS

Fringed Arboreal Alligator Lizard

Abronia fimbriata

Abronia fimbriata es un lagarto arborícola de color pardo, con escamas en forma de espina sobre el oído, procedente de los bosques nubosos de las tierras altas del noreste de Guatemala. Alcanza unos 25-35 cm, es vivíparo y se alimenta de insectos. Necesita un terrario alto y bien ventilado, con musgo y bromelias, y temperaturas frescas. La especie está amenazada y su cuidado está descrito de forma escasa.

Familia: Anguidae Nombre anterior: *Barissia fimbriata; Gerrhonotus fimbriatus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**25-35 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Bosque de montaña**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**50 × 50 × 75 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**20-27 °C**
Punto caliente	**26-30 °C**
Temperatura, noche	**10-18 °C**
Humedad	**60-80 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Madurez sexual	**24-36 meses**
Tamaño de la camada	**4 crías**
Puestas por año	**1**
Gestación	**180-240 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice I**
Anexo de la UE	**Anexo A**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO
El cuidado de *Abronia fimbriata* está descrito solo de forma escasa, y las cifras que se dan aquí proceden de la especie muy emparentada *Abronia graminea*, la mejor conocida del género.

TEMPERATURA
Abronia fimbriata no tolera el calor. La temperatura diurna debe situarse en 20-27 °C, y el punto de calor bajo un foco suave puede estar a 26-30 °C. El animal es más activo a 24-27 °C.

HUMEDAD Y AGUA
La humedad relativa debe situarse en 60-80 %, con los valores más altos por la noche y tras la pulverización.

ILUMINACIÓN Y UVB
La especie es diurna y necesita UVB. Lo mejor es la luz solar natural sin filtrar, por ejemplo en una jaula de malla al aire libre con tiempo seco en verano, con sombra y un sustrato fresco para que el animal pueda desplazarse.

ALIMENTACIÓN
Abronia fimbriata se alimenta de insectos y otros animales pequeños.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN
La especie es tranquila y tímida. El animal pasa la mayor parte del día inmóvil sobre una rama o en una bromelia y toma el sol durante periodos cortos. No es un animal para manipular.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL
Guatemala.