herpy

CAMALEONES

Carpet Chameleon

Furcifer lateralis

Furcifer lateralis es un camaleón pequeño y colorido de los bosques, matorrales y jardines de Madagascar. La hembra presenta un diseño especialmente intenso, sobre todo cuando está gestante. La especie alcanza solo 17-25 cm, madura en pocos meses y vive únicamente 2-3 años; su tamaño modesto la convierte en un camaleón asequible para el aficionado con experiencia.

Familia: Chamaeleonidae Nombre anterior: *Chamaeleo lateralis; Chamaeleo lambertoni*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**17-25 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**2-3 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Sabana y selva tropical**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-29 °C**
Punto caliente	**32-35 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**60-100 %**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**3-6 meses**
Tamaño de la puesta	**6-23 huevos**
Puestas por año	**3-6**
Incubación	**150-400 días** a 20-25 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un ejemplar adulto necesita un terrario de al menos 45 × 45 × 60 cm (largo × ancho × alto).
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe ser de 24-29 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe ser del 60-100 %. El terrario puede secarse a lo largo del día, siempre que el aire sea relativamente húmedo y el animal pueda beber a diario.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y amante del sol, por lo que requiere luz intensa y UVB. Usa un tubo T5 HO de 6500 K para la iluminación y un tubo UVB que proporcione la zona 3 de Ferguson en la zona de sol.
ALIMENTACIÓN	*F. lateralis* es estrictamente insectívoro. La presa debe tener aproximadamente la longitud de la distancia entre los ojos; los gusanos de la harina pueden ser más largos.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie se mantiene en solitario. Los machos son agresivos y territoriales, y las hembras se estresan con facilidad. Los animales pueden morderse, así que la cópula debe vigilarse y los animales deben separarse cuando termine.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Madagascar.