herpy

CAMALEONES

Lesser Chameleon

Furcifer minor

Furcifer minor es un camaleón pequeño de las tierras altas centrales de Madagascar. El macho es beige y marrón, con dos cuernos nasales, mientras que la hembra es la más colorida, sobre todo cuando lleva huevos. La especie alcanza 16-23 cm en total, está amenazada en la naturaleza y es poco frecuente en cautividad. Requiere un cuidador con experiencia en camaleones, sobre todo porque las hembras tienen problemas con la puesta con facilidad.

Familia: Chamaeleonidae Nombre anterior: *Chamaeleo minor*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**16-23 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**2-4 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Sabana, bosque seco y bosque de montaña**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**21-26 °C**
Punto caliente	**32-38 °C**
Temperatura, noche	**15-20 °C**
Humedad	**60-100 %**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**5-9 meses**
Tamaño de la puesta	**4-18 huevos**
Puestas por año	**1-3**
Incubación	**190-270 días** a 22-24 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un ejemplar adulto necesita un terrario de al menos 45 × 45 × 60 cm (largo × ancho × alto). La especie es pequeña y no exige un terrario grande, pero algunos ejemplares son más inquietos y se desenvuelven mejor con más espacio.

TEMPERATURA

La temperatura diurna debe ser de 21-26 °C. Usa una zona de calor de 32-38 °C, medida como temperatura superficial con un termómetro de infrarrojos, y deja el suelo más fresco.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad relativa debe situarse en 60-100 %. La especie procede de una zona de alta humedad ambiental, pero el terrario debe secarse a lo largo del día para evitar agua estancada y enfermedades.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y amante del sol, y necesita una iluminación intensa.

ALIMENTACIÓN

F. minor es estrictamente insectívora. Ofrece una dieta variada: grillos, cucarachas, escarabajos de las judías y moscas de la fruta.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La especie se mantiene de forma individual, y solo se juntan dos ejemplares para el apareamiento. Los animales son agresivos con sus congéneres, incluidas las crías, y pueden causarse daños graves.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Madagascar.