herpy

CAMALEONES

Von Hoehnel's Chameleon

Trioceros hoehnelii

Trioceros hoehnelii es un camaleón pequeño y vivíparo de las frescas tierras altas de Kenia y Uganda, donde las noches pueden acercarse al punto de congelación. El macho tiene un casco alto y un cuerno en el hocico. La especie es resistente al frío, pero tolera mal el calor, por lo que necesita un terrario fresco con un descenso claro de la temperatura por la noche y una humedad nocturna elevada.

Familia: Chamaeleonidae Nombre anterior: *Chamaeleo hoehnelii; Chamaeleo bergeri; Chamaeleo leikipiensis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**18-25 cm** longitud total con la cola
Peso	**15-70 g**
Esperanza de vida	**5-6 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Bosque de montaña**
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Madurez sexual	**12 meses**
Tamaño de la camada	**4-22 crías**
Puestas por año	**1-2**
Gestación	**120-180 días**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 45 × 90 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**20-22 °C**
Punto caliente	**24-25 °C**
Temperatura, noche	**8-14 °C**
Humedad	**50-100 %**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un adulto necesita un terrario de al menos 60 × 45 × 90 cm (largo × ancho × alto). La medida se ha tomado de camaleones pequeños de montaña similares del género *Trioceros* y es un mínimo.

TEMPERATURA

La especie procede de tierras altas frescas y tolera mal el calor. La temperatura diurna en el terrario debe ser de 20-22 °C, con una zona de insolación de 24-25 °C. Los ejemplares jóvenes pueden morir si la temperatura sube más.

HUMEDAD Y AGUA

La noche es el momento húmedo de la especie. La humedad del aire debe subir hacia el 100 % por la noche, con niebla de un humidificador ultrasónico durante unas tres horas a última hora de la noche y a primera hora de la mañana.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y necesita mucha luz. Ofrece 12 horas de luz al día durante todo el año. Un tubo T5 HO de 6500 K o una lámpara LED potente a lo ancho del terrario proporciona la luz general. El UVB es necesario.

ALIMENTACIÓN

T. hoehnelii es insectívoro y come la mayoría de los insectos de tamaño adecuado.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La especie se mantiene en solitario. Los machos son muy agresivos entre sí y con especies similares: sisean, se hinchan y se vuelven negros, por lo que los machos no deben poder verse.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Kenia y Uganda.