herpy

CAMALEONES

Camaleón de Jackson

Trioceros jacksonii

Trioceros jacksonii es un camaleón de tamaño mediano de los bosques de montaña de Kenia y Tanzania. El macho lleva tres cuernos orientados hacia delante y la hembra pare crías vivas en lugar de poner huevos. La especie necesita noches frescas, una humedad nocturna alta y unos cuidados meticulosos, por lo que es más adecuada para el cuidador con experiencia.

Familia: Chamaeleonidae Nombre en inglés: Jackson's Chameleon Nombre anterior: *Chamaeleo jacksonii; Chamaeleon jacksonii*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-38 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-9 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Bosque de montaña**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 60 × 120 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**20-24 °C**
Punto caliente	**27-30 °C**
Temperatura, noche	**10-15 °C**
Humedad	**40-100 %**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Madurez sexual	**5-12 meses**
Tamaño de la camada	**8-30 crías**
Gestación	**150-180 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un ejemplar adulto necesita un terrario de al menos 60 × 60 × 120 cm (largo × ancho × alto). La altura es más importante que la superficie del suelo, porque la especie aprovecha toda la altura.

TEMPERATURA

La especie es de tierras altas y tolera mal el calor. La temperatura diurna en el terrario debe ser de 20-24 °C. En la zona de sol bajo la lámpara debe haber 27-30 °C.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad del aire debe seguir el ritmo diario de la especie: aproximadamente 90-100 % por la noche y 40-50 % durante el día. Un 60-80 % constante no es correcto y puede enfermar al animal.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y necesita mucha luz. Un tubo T5 HO de 6500 K o una potente lámpara LED que cubra todo el ancho del terrario proporciona la luz.

ALIMENTACIÓN

T. jacksonii es insectívoro. La presa no debe ser mayor que la distancia entre los ojos. Varía la alimentación: saltamontes, grillos, ninfas de cucaracha, moscas y pequeños escarabajos.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La especie se mantiene en solitario durante toda su vida. Los machos son territoriales y nunca deben poder verse entre sí. Dos animales se juntan solo cuando se lleva una hembra a un macho para el apareamiento.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Kenia y Tanzania.