herpy

CAMALEONES

Meller's Chameleon

Trioceros melleri

Trioceros melleri es el camaleón más grande del continente africano. Alcanza hasta 60 cm de largo, lleva un único cuerno pequeño en el hocico y vive en sabanas arbustivas y bosques claros de Tanzania, Malaui y Mozambique. La especie exige mucho espacio, agua en abundancia y noches frescas y húmedas, y solo es apta para un cuidador experimentado.

Familia: Chamaeleonidae Nombre anterior: *Chamaeleo melleri; Ensirostris melleri*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**30-60 cm** longitud total con la cola
Peso	**300-500 g**
Esperanza de vida	**5-14 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Sabana y bosque seco**
Dificultad	**Experto**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**15-80 huevos**
Puestas por año	**1**
Incubación	**180-270 días** a 24-26 °C

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 90 × 150 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**22-28 °C**
Punto caliente	**29-32 °C**
Temperatura, noche	**15-20 °C**
Humedad	**40-100 %**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un ejemplar adulto necesita un terrario de al menos 120 × 90 × 150 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande, mejor. La especie se hace grande y pesada, y una habitación entera o un gran recinto exterior no es demasiado.

TEMPERATURA

La temperatura diurna en el terrario debe ser de 22-28 °C y, en la zona de sol bajo la lámpara, de 29-32 °C. Los animales de la costa de Tanzania prosperan mejor en el extremo cálido del rango.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad del aire debe seguir el ciclo diario: 40-50 % de día y más del 90 % de noche. La humedad constante provoca infecciones respiratorias y hongos, así que todas las superficies deben secarse a lo largo del día.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y necesita luz intensa durante 12 horas al día. Usa un tubo T5 HO de UVB en un reflector individual a lo largo del terrario y complétalo con luz de espectro completo o para plantas, para que estas prosperen.

ALIMENTACIÓN

T. melleri es insectívoro. Ofrece presas variadas y grandes: grillos, saltamontes, cucarachas, pupas de gusano de seda, insectos palo y larvas de mosca soldado negra.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La especie se mantiene en solitario durante toda su vida. Los machos son muy territoriales, e incluso una pareja en un terrario grande causa problemas; los dos animales se juntan solo brevemente para el apareamiento.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Malaui, Mozambique y Tanzania.