herpy

CECILIAS

## Taita African Caecilian

# *Boulengerula taitana*

*Boulengerula taitana* es una cecilia pequeña y sin patas que solo se encuentra en las montañas Taita, en el sureste de Kenia. La hembra pone pocos huevos en una cámara excavada en el suelo y permanece con ellos, y las crías recién nacidas se alimentan de su capa más externa de piel. La especie está amenazada y apenas se conoce nada sobre su mantenimiento en cautividad.

Familia: Herpelidae  Nombre anterior: *Boulengerula taitanus; Afrocaecilia taitana*

DATOS CLAVE

### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **24-30 cm**<br>longitud total con la cola |
| Esperanza de vida | **5-10 años** |
| Activo | **De noche** |
| Modo de vida | **Excavador** |
| Hábitat | **Bosque de montaña** |
| Toxinas cutáneas | **Ninguna conocida** |
| Dificultad | **Avanzado** |

### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **40 × 30 × 30 cm**<br>L × An × Al para 1 adulto |
| Temperatura, día | **21-24 °C** |
| Temperatura, noche | **19-22 °C** |
| Humedad | **90-100 %** |
| Agua | **Sin bebedero** |
| UVB | **No necesario** |
| Alimentación | **Insectos y lombrices/caracoles** |
| Se mantiene | **En solitario** |

### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Ovípara** |
| Desarrollo | **Desarrollo directo (sin larvas)** |
| Lugar de puesta | **En el suelo** |
| Madurez sexual | **24 meses** |
| Huevos por temporada | **5** |
| Cuidado parental | **Vigila los huevos** |

### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **No incluida** |
| Anexo de la UE | **No incluida** |
| UICN | **En peligro (EN)** |

## Cuidados de un vistazo

| | |
|---|---|
| **EL TERRARIO** | Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Boulengerula taitana*. El clima de las montañas Taita es tropical pero suave por la altitud, con dos estaciones de lluvias, y la especie vive en suelo húmedo y suelto. |
| **TEMPERATURA** | La temperatura del suelo no se ha medido para la especie. 21-24 °C de día y 19-22 °C de noche es una estimación acorde con las cecilias terrestres y un clima de montaña suave. |
| **HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN** | El sustrato debe estar uniformemente húmedo y el aire de la caja casi saturado, con un 90-100 %. |
| **AGUA Y CALIDAD DEL AGUA** | La especie no necesita bebedero ni zona de agua. La condensación en las paredes de la caja es suficiente para beber, y el agua se usa solo para mantener húmedo el sustrato. |
| **ILUMINACIÓN Y UVB** | La especie vive bajo tierra y no necesita UVB ni otra iluminación. Basta con el ciclo normal de día y noche de la habitación, con 10-14 horas de luz. La caja se mantiene a oscuras y no debe estar expuesta al sol directo. |
| **ALIMENTACIÓN** | En la naturaleza, *Boulengerula taitana* come sobre todo termitas y lombrices de tierra; las crías toman sobre todo lombrices. En cautividad, las lombrices pequeñas son el alimento base más realista. |
| **COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN** | *Boulengerula taitana* vive oculta bajo tierra, y un animal sano permanece enterrado la mayor parte del tiempo. La especie se mantiene en solitario, para poder seguir fácilmente su peso y su salud. |
| **ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL** | Kenia. |