herpy

CECILIAS

Koh Tao Caecilian

Ichthyophis kohtaoensis

Ichthyophis kohtaoensis es una cecilia excavadora del sudeste asiático con una vida en dos fases: los adultos viven en tierra húmeda, mientras que las crías eclosionan como larvas acuáticas con branquias externas. La hembra pone los huevos en una cámara excavada en la tierra junto al agua y los vigila. Se sabe poco sobre el mantenimiento de esta especie.

Familia: Ichthyophiidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**30-40 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Excavador**
Hábitat	**Bosque seco y selva tropical**
Toxinas cutáneas	**Ninguna conocida**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**50 × 30 × 35 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**23-25 °C**
Temperatura, noche	**21-23 °C**
Humedad	**90-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en grupo**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Desarrollo	**Larvas en el agua**
Lugar de puesta	**En el suelo**
Huevos por temporada	**20-40**
Periodo larvario	**120-240 días** desde la eclosión hasta la metamorfosis
Alimentación de las larvas	**Pequeños invertebrados acuáticos (dafnias, larvas de mosquito)**
Cuidado parental	**Vigila los huevos**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Datos insuficientes (DD)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Ichthyophis kohtaoensis*. Los cuidados se basan en la experiencia con cecilias excavadoras de tamaño similar, que se mantienen del mismo modo, entre ellas *Geotrypetes seraphini*.
TEMPERATURA	Mantén 23-25 °C de día y 21-23 °C de noche. La temperatura debe ser estable y variar como máximo unos 3 °C; los cambios rápidos y grandes se toleran mal.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	El sustrato debe estar uniformemente húmedo, pero no tan mojado como para poder escurrir agua de un puñado, y nunca debe haber agua acumulada en el fondo de la caja.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Los adultos no necesitan bebedero. Obtienen el agua del sustrato húmedo y de la condensación en las paredes de la caja, y un bebedero hace que el sustrato se empape con facilidad.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie vive bajo tierra y no necesita UVB ni una iluminación especial. Basta con un ciclo normal de día y noche en la habitación, con 10-14 horas de luz. La caja no debe recibir sol directo.
ALIMENTACIÓN	Las lombrices de tierra son el alimento principal y las aceptan casi todas las cecilias terrestres. Usa lombrices de tamaño pequeño a mediano, por ejemplo lombrices de compost, y córtalas en trozos para las crías.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Ichthyophis kohtaoensis* lleva una vida oculta y pasa casi todo el tiempo enterrada.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Tailandia, Camboya, Laos, Myanmar (Birmania) y Vietnam.