herpy

CECILIAS

Aqua Ize Caecilian

Schistometopum thomense

Schistometopum thomense es una cecilia sin patas y excavadora que solo vive en Santo Tomé y en la pequeña isla vecina de Ilhéu das Rolas, en el golfo de Guinea. Suele ser de un amarillo intenso, es vivípara, con crías completamente desarrolladas, y es una de las pocas cecilias criadas en cautividad. Su mantenimiento gira en torno a un sustrato profundo y húmedo, sin abonos ni plaguicidas.

Familia: Dermophiidae **Toxinas cutáneas leves**

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**20-34 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-10 años**
Activo	**De día y de noche**
Modo de vida	**Excavador**
Hábitat	**Selva tropical**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Avanzado**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Desarrollo	**Vivípara**
Madurez sexual	**24 meses**
Tamaño de la camada	**1-16 crías**
Cuidado parental	**Ninguno**

CUIDADOS

Terrario mín.	**50 × 30 × 30 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**21-24 °C**
Temperatura, noche	**20-22 °C**
Humedad	**85-100 %**
Agua	**Sin bebedero**
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en grupo**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	La especie es terrestre y excavadora, así que el mantenimiento gira en torno al sustrato. Se mantiene y se cría en pequeño número, y las pautas se basan en la propia especie y en otras cecilias terrestres.
TEMPERATURA	La temperatura diurna es de 21-24 °C y la nocturna de 20-22 °C, lo que se corresponde con el suelo de los bosques de montaña de la especie. Por lo general no hace falta calefacción en una habitación con temperatura estable.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad del aire en la caja es del 85-100 %, porque la tierra está húmeda. La humedad se mantiene pulverizando la tierra y removiendo de vez en cuando los primeros centímetros.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	La especie no necesita bebedero ni zona de agua. La humedad procede de la tierra, y la condensación en las paredes de la caja basta para beber. Nada con mucha torpeza y el agua profunda supone un riesgo de ahogamiento.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es activa tanto de día como de noche y al principio se deja ver a menudo en la superficie; tras unas semanas de adaptación se ve con menos frecuencia.
ALIMENTACIÓN	Las lombrices de tierra son el alimento base, y también aceptan larvas de la polilla de la cera. Un adulto recibe 10-15 lombrices pequeñas cada dos semanas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*S. thomense* excava extensos sistemas de galerías. En la naturaleza, varios ejemplares se agrupan en el mismo tocón.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Santo Tomé y Príncipe.