herpy

CECILIAS

Rubber Eel

Typhlonectes natans

Typhlonectes natans es un anfibio ápodo totalmente acuático de Colombia y Venezuela, con un cuerpo largo, liso y de color gris azulado oscuro, ojos pequeños bajo la piel y una aleta dorsal baja. La especie es vivípara y se mantiene en un acuario cálido, de agua blanda y bien filtrada, con una tapa pesada y que cierre herméticamente.

Familia: Typhlonectidae

Toxinas cutáneas leves

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**25-73 cm** longitud total con la cola
Peso	**40-250 g**
Esperanza de vida	**10-14 años**
Activo	**De día, al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Acuático**
Hábitat	**Sabana y humedal**
Toxinas cutáneas	**Leves** Lávate las manos después del contacto y mantén los dedos alejados de los ojos y la boca
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 45 × 50 cm** L × An × Al para 3 adultos
Temperatura, día	**24-30 °C**
Temperatura, noche	**24-30 °C**
Humedad	**100 %**
Agua	**Acuaterrario** profundidad 30-40 cm
Temperatura del agua	**24-30 °C**
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Insectos, alimento completo, vertebrados y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En grupo**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Desarrollo	**Vivípara**
Madurez sexual	**48 meses**
Tamaño de la camada	**1-11 crías**
Gestación	**210-300 días**
Cuidado parental	**Ninguno**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Typhlonectes natans* se mantiene en un acuario. Tres adultos necesitan como mínimo 120 × 45 × 50 cm (unos 250 litros) con un filtro exterior grande. Cuanto mayor es el volumen de agua, más estable es su calidad.
TEMPERATURA	La temperatura del agua debe ser de 24-30 °C. Una variación estacional natural dentro de ese rango imita los ríos del área de distribución y puede favorecer la reproducción. A unos 32 °C se produce estrés térmico.
HUMEDAD Y PULVERIZACIÓN	La humedad ambiental no tiene importancia, porque el animal vive en el agua. El aire bajo una tapa hermética está saturado de humedad, y por eso figura 100 % en la ficha.
AGUA Y CALIDAD DEL AGUA	Las cecilias absorben sustancias a través de la piel, por lo que la calidad del agua es decisiva. El filtro debe estar rodado antes de introducir a los animales.
ILUMINACIÓN Y UVB	Basta con iluminación normal de acuario 12 horas al día. Los animales prefieren la oscuridad, así que debe haber siempre refugios oscuros.
ALIMENTACIÓN	*Typhlonectes natans* come casi cualquier alimento cárnico: lombrices de tierra, grillos, larvas de escarabajo, gambas y otros crustáceos, mejillones, larvas de mosquito, pescado descongelado, ratones recién nacidos y alimento preparado para anfibios.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es pacífica, no territorial y se encuentra mejor en grupo, compartiendo refugios.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia y Venezuela.