herpy

ESCINCOS

Gold Skink

Eumeces schneiderii

Un escinco robusto, liso y veloz de las regiones áridas entre el norte de África y Asia central. *Eumeces schneiderii* presenta una coloración que va del color arena al marrón oliváceo con manchas naranjas, se entierra con gusto en arena suelta y es una especie de terrario resistente y longeva, siempre que disponga de sol, UVB y un sustrato profundo.

Familia: Scincidae Nombre anterior: *Eumeces schneideri; Novoeumeces schneideri*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**30-45 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15-20 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Desierto y semidesierto**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 45 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**25-30 °C**
Punto caliente	**40-45 °C**
Temperatura, noche	**20-25 °C**
Humedad	**20-40 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos, fruta y vertebrados**
Se mantiene	**En solitario o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**5-15 huevos**
Incubación	**40-60 días** a 28-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Eumeces schneiderii vive en el suelo y excava, por lo que lo más importante son la superficie del suelo y el sustrato. Una pareja o un macho con dos hembras necesitan como mínimo 120 × 60 × 45 cm (largo × ancho × alto).

TEMPERATURA

El terrario debe tener un gradiente claro. De día debe estar a 25-30 °C, más cálido cerca de la zona de sol y más fresco en el extremo opuesto.

HUMEDAD Y AGUA

La especie procede de regiones áridas y debe mantenerse seca, con una humedad ambiental del 20-40 %, en todo caso por debajo del 50 %. Basta con pulverizar ligeramente una vez por semana.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y necesita UVB durante todo el tiempo que la luz esté encendida. Pertenece a la zona 3 de Ferguson y necesita un índice UV de alrededor de 3 en la zona de sol.

ALIMENTACIÓN

Eumeces schneiderii es omnívoro, pero come sobre todo insectos vivos y otros animales pequeños: grillos, cucarachas, gusanos de la harina, supergusanos, gusanos de seda, caracoles y lombrices de tierra.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

La especie es curiosa y explora con gusto su entorno. Los ejemplares nuevos suelen ser cautelosos, pero con paciencia y alimentándolos con pinzas se tranquilizan.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Israel, Territorios Palestinos, Chipre, Turquía, Siria, Líbano, Jordania, Irán, Irak, Arabia Saudí, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Afganistán y Pakistán.