herpy

ESCINCOS

Western Blue-Tongued Lizard

Tiliqua occipitalis

Tiliqua occipitalis es un escincido robusto y terrestre del sur y el centro de Australia, con bandas transversales pardas en el cuerpo y la cola y la lengua azul y ancha que caracteriza al género. La especie alcanza unos 40 cm de longitud, es diurna y omnívora y necesita un terrario grande con UVB y una zona de baño de sol caliente. Es vivípara y se ve muy raramente en cautividad.

Familia: Scincidae Nombre anterior: *Cyclodus occipitalis; Cyclodus fasciatus*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**35-45 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**15-20 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Semidesierto y bosque y prado templados**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**120 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**22-32 °C**
Punto caliente	**35-45 °C**
Temperatura, noche	**15-22 °C**
Humedad	**30-50 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos, fruta, plantas, vertebrados y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Tamaño de la camada	**5 crías**
Puestas por año	**1**
Gestación	**90-120 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice III**
Anexo de la UE	**Anexo C**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un adulto necesita un terrario de al menos 120 × 60 × 60 cm (largo × ancho × alto). Cuanto más grande, mejor. La superficie del suelo es más importante que la altura, porque el animal vive en el suelo.

TEMPERATURA

Ofrece al animal un gradiente de temperatura de 22-26 °C en el extremo fresco a 28-32 °C en el extremo cálido. La superficie de la zona de baño de sol debe estar a 35-45 °C, y el animal debe poder elegir qué temperatura prefiere.

HUMEDAD Y AGUA

La especie procede de zonas áridas y semiáridas y no necesita una humedad ambiental alta. Son adecuados 30-50 %, medidos en el extremo fresco. El sustrato debe estar ligeramente húmedo en profundidad, pero nunca mojado.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y necesita tanto UVB como una luz intensa. Usa un tubo T5 con UVB sobre la malla y colócalo de modo que el índice UV en la zona de baño de sol sea de 3-4 (zona 3 de Ferguson).

ALIMENTACIÓN

Tiliqua occipitalis es omnívora, y la alimentación debe ser lo más variada posible.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El escinco es tímido los primeros días, pero se acostumbra y tolera una manipulación tranquila.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Australia.