herpy

ESCINCOS

Eslizón lengua azul

Tiliqua scincoides

Un eslizón robusto y de cuerpo pesado, originario de Australia y del este de Indonesia, con una lengua ancha de un azul intenso que muestra cuando se siente amenazado. *Tiliqua scincoides* es diurno, omnívoro y tranquilo, alcanza entre 45 y 60 cm de longitud y puede vivir unos 20 años. Requiere un terrario grande, UVB y una zona de calor para tomar el sol.

Familia: Scincidae Nombre en inglés: Common Blue-tongued Skink Nombre anterior: *Lacerta scincoides*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**45-60 cm** longitud total con la cola
Peso	**400-600 g**
Esperanza de vida	**15-20 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre**
Hábitat	**Sabana y bosque y prado templados**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**180 × 60 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**21-33 °C**
Punto caliente	**35-45 °C**
Temperatura, noche	**18-24 °C**
Humedad	**40-60 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos, fruta, plantas y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario**

CRÍA

Reproducción	**Vivípara**
Madurez sexual	**18-36 meses**
Tamaño de la camada	**6-15 crías**
Puestas por año	**1**
Gestación	**90-120 días**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice III**
Anexo de la UE	**Anexo C**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un animal adulto necesita un terrario de al menos 180 × 60 × 60 cm (largo × ancho × alto), lo que equivale a algo más de 1 m² de superficie. Cuanto más grande, mejor, por ejemplo 180 × 120 × 90 cm.

TEMPERATURA

El animal debe poder elegir entre 21-26 °C en el extremo fresco y 28-33 °C en el extremo cálido. La superficie de la zona de insolación debe estar a 35-45 °C.

HUMEDAD Y AGUA

Las subespecies australianas necesitan una humedad ambiental del 40-60 %, medida en el extremo fresco. La subespecie indonesia *T. s. chimaerea* requiere un 60-80 %.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y necesita tanto UVB como luz intensa. Usa un tubo T5 con UVB y colócalo de modo que el índice UV en la zona de insolación sea de aproximadamente 3-4 (zona 3 de Ferguson).

ALIMENTACIÓN

Tiliqua scincoides es omnívoro. La dieta base es una mezcla de verdura, proteína animal y algo de fruta. Las crías de menos de 12 meses deben recibir un 70-80 % de proteína, los adultos alrededor de un 50-60 %.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Tiliqua scincoides es tranquilo, y los animales de cría suelen volverse muy dóciles. Los capturados en la naturaleza están más estresados y son más defensivos.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Australia y Indonesia.