herpy

ESCINCOS

African Five-lined Skink

Trachylepis quinquetaeniata

Trachylepis quinquetaeniata es un eslizón activo y diurno del norte y centro de África, con escamas brillantes de aspecto metálico, franjas longitudinales claras y una cola que en los ejemplares jóvenes y en las hembras brilla con un azul eléctrico. Toma el sol sobre las rocas y se alimenta de insectos. Es rápido y asustadizo, por lo que resulta más adecuado como animal de exhibición que para manipular.

Familia: Scincidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**20-25 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**4-5 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Rupícola y terrestre**
Hábitat	**Semidesierto, sabana y terreno rocoso**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**90 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-29 °C**
Punto caliente	**32-35 °C**
Temperatura, noche	**20-22 °C**
Humedad	**60-80 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**12-15 meses**
Tamaño de la puesta	**3-10 huevos**
Puestas por año	**1-2**
Incubación	**60-62 días** a 27-29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un solo ejemplar necesita un terrario de al menos 90 × 45 × 45 cm. La especie es rápida y muy activa y aprovecha todo el espacio que se le da, así que cuanto mayor, mejor.

TEMPERATURA

Trachylepis quinquetaeniata es una especie amante del sol. Durante el día el terrario debe estar a 24-29 °C y la zona de solario a 32-35 °C, medidos en la superficie con un sensor digital o un termómetro de infrarrojos.

HUMEDAD Y AGUA

La especie requiere una humedad ambiental moderada del 60-80 %, más baja de día y más alta de noche.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es diurna y necesita una luz intensa y clara y UVB. Toma el sol en terreno abierto y pedregoso y, por su modo de vida, pertenece a la zona 3 de Ferguson.

ALIMENTACIÓN

La especie es insectívora. Ofrece grillos, cucarachas (p. ej.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Trachylepis quinquetaeniata es rápido, nervioso y alerta, y es un animal para observar. Huye, pierde la cola y se estresa con la manipulación repetida.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Benín, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, Côte d'Ivoire, Yibuti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Ghana, Guinea, Kenia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo y Uganda.