herpy

ESCINCOS

Blanchard's Helmet Skink

Tribolonotus blanchardi

Tribolonotus blanchardi es un escinco muy pequeño de los bosques de las islas Salomón y Bougainville. Mide solo 3-4 cm del hocico a la cloaca, vive oculto entre la hojarasca húmeda a lo largo de pequeños arroyos del bosque y pone un solo huevo cada vez. Se sabe poco sobre la especie y su cuidado.

Familia: Scincidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**3-4 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10 años**
Activo	**De día y al crepúsculo**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 30 × 30 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-26 °C**
Temperatura, noche	**20-22 °C**
Humedad	**80-90 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1 huevos**
Incubación	**65-85 días** a 23-27 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Tribolonotus blanchardi*.
TEMPERATURA	*Tribolonotus blanchardi* no usa zonas de insolación. Mantén 24-26 °C de día sin zona de insolación y 20-22 °C de noche.
HUMEDAD Y AGUA	*Tribolonotus blanchardi* tolera muy mal la desecación. La humedad ambiental debe ser alta, 80-90 %, y el sustrato debe estar siempre húmedo. Pulveriza por la mañana y por la noche, o usa un sistema de lluvia automático.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Tribolonotus blanchardi* vive oculta entre la hojarasca en bosque sombrío.
ALIMENTACIÓN	*Tribolonotus blanchardi* come insectos. Ofrece presas pequeñas: grillos pequeños, moscas de la fruta, colémbolos, cucarachas pequeñas y lombrices pequeñas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Tribolonotus blanchardi* es tímida y pasa la mayor parte del tiempo oculta. Es un animal para observar y no para manipular. Deja a un ejemplar recién llegado al menos dos semanas en paz.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea.