herpy

ESCINCOS

Spiny Skink

Tribolonotus novaeguineae

Tribolonotus novaeguineae es un escinco pequeño y tímido de la selva tropical de tierras bajas de Nueva Guinea, con hileras de escamas puntiagudas y curvadas hacia atrás a lo largo del dorso. Vive oculto en la hojarasca húmeda, es más activo al anochecer y pone un solo huevo cada vez. Se sabe poco sobre el cuidado de esta especie en concreto y resulta más adecuada como animal de exhibición.

Familia: Scincidae Nombre anterior: *Zonurus novaeguineae*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**16-20 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Selva tropical y humedal**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-27 °C**
Punto caliente	**27-28 °C**
Temperatura, noche	**22-24 °C**
Humedad	**70-90 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**36-48 meses**
Tamaño de la puesta	**1 huevos**
Puestas por año	**1-6**
Incubación	**65-85 días** a 23-27 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**Anexo D**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre el cuidado de *Tribolonotus novaeguineae*.
TEMPERATURA	La temperatura diurna debe ser de 24-27 °C, y un refugio cálido de 27-28 °C mantiene activo al animal aunque no tome el sol. Por la noche son adecuados 22-24 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe ser del 70-90 %, más alta por la noche, y el sustrato debe estar siempre húmedo.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es activa al anochecer y no necesita una zona de sol intensa, pero 12 horas de luz al día mantienen el ritmo diario.
ALIMENTACIÓN	*Tribolonotus novaeguineae* es insectívoro. La base de la dieta son grillos, cucarachas, lombrices de tierra, gusanos de la harina y gusanos de seda, y las larvas de la polilla de la cera y los superworms se dan en menor cantidad.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Tribolonotus novaeguineae* es un animal para observar y no para manipular. Cuando se la sujeta, puede emitir sonidos, hacerse la muerta, intentar huir o soltar la cola, y eso la estresa.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Indonesia y Papúa Nueva Guinea.