herpy

ESCINCOS

Giant Spiny Skink

Tribolonotus ponceleti

Tribolonotus ponceleti es un escincido raro y de vida oculta procedente de las islas del archipiélago de las Salomón, y la mayor especie de su género. Tiene escamas quilladas y espinosas y una cabeza angulosa y acorazada, vive en el suelo del bosque, se entierra y puede emitir sonidos. Los cuidados se basan en el clima y en los parientes cercanos *Tribolonotus gracilis* y *Tribolonotus novaeguineae*.

Familia: Scincidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**11-13 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**75 × 45 × 45 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-27 °C**
Punto caliente	**27-28 °C**
Temperatura, noche	**22-24 °C**
Humedad	**70-90 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1 huevos**
Incubación	**65-85 días** a 23-27 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Datos insuficientes (DD)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe muy poco sobre los cuidados de *Tribolonotus ponceleti*. El clima de su área de distribución es cálido y húmedo todo el año, y la especie vive entre la hojarasca del suelo del bosque.
TEMPERATURA	Mantén el terrario a 24-27 °C en la zona fría y a 27-28 °C en un escondite cálido, y deja que la temperatura baje a 22-24 °C por la noche.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad del aire debe ser del 70-80 % durante el día y más alta por la noche, preferiblemente del 80-90 %, y el sustrato debe estar siempre húmedo.
ILUMINACIÓN Y UVB	El animal es activo al anochecer y por la noche, y la necesidad de UVB no está documentada.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza la especie come artrópodos. La base de la dieta pueden ser grillos, cucarachas, gusanos de la harina, gusanos de seda, larvas de mosca soldado negra, lombrices de tierra y caracoles.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Tribolonotus ponceleti* es un animal para observar y no para manipular. Los escincos del género se hacen los muertos, intentan huir, sueltan la cola o emiten sonidos cuando se les agarra, y eso les provoca estrés.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea.