herpy

GECKOS

Chameleon gecko

Carphodactylus laevis

Carphodactylus laevis es un gecko esbelto y nocturno de las selvas tropicales del noreste de Queensland. Tiene patas largas y delgadas, garras en los dedos, una cresta a lo largo del dorso y una cola con forma de zanahoria, y su constitución es muy distinta a la de la mayoría de los geckos. Los ejemplares criados en cautividad son resistentes y se reproducen con facilidad, pero la especie sigue siendo escasa en cautividad.

Familia: Carphodactylidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**11-13 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical y bosque de montaña**
Dificultad	**Intermedio**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**24-36 meses**
Tamaño de la puesta	**2 huevos**
Puestas por año	**4-6**
Incubación	**90-133 días** a 21-27 °C

CUIDADOS

Terrario mín.	**50 × 35 × 70 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**22-28 °C**
Temperatura, noche	**16-22 °C**
Humedad	**75-100 %**
UVB	**No necesario**
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice III**
Anexo de la UE	**Anexo C**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	*Carphodactylus laevis* necesita un terrario alto que dé espacio a los animales para evitarse entre sí.
TEMPERATURA	*Carphodactylus laevis* tiene pocas exigencias de calor. De día, el terrario debe mantenerse a 22-28 °C, y por la noche la temperatura baja 5-6 grados, hasta unos 16-22 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental es fundamental para *Carphodactylus laevis* y debe mantenerse siempre en el 75-100 %. Pulveriza el terrario a fondo con agua tibia todos los días y vigila especialmente la humedad con tiempo cálido y seco.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Carphodactylus laevis* es nocturna y vive escondida durante el día, por lo que no es necesario UVB. Basta con la luz natural de una ventana cercana; si no, una luz LED tenue o un tubo fluorescente.
ALIMENTACIÓN	*Carphodactylus laevis* no es exigente una vez que se ha acostumbrado a la cautividad. Los grillos pueden constituir casi toda la dieta, preferiblemente complementados con cucarachas. Alimenta 2-3 veces por semana.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Carphodactylus laevis* permanece quieta y escondida durante el día y se activa pocos minutos después de la caída de la noche. Entonces se sitúa sobre una rama o un trozo de corteza y a menudo permanece allí durante horas.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Australia.