herpy

GECKOS

Bibron's thick-toed gecko

Chondrodactylus bibronii

Un gecko rupícola robusto y nocturno del Karoo y de las regiones áridas del sur de África, con dedos gruesos, piel rugosa y bandas transversales oscuras. Es resistente y fácil de mantener, pero a menudo se vende con un nombre incorrecto: muchos de los animales que se comercializan son en realidad la especie emparentada *Chondrodactylus turneri*.

Familia: Gekkonidae Nombre anterior: *Pachydactylus bibronii; Pachydactylus bibroni; Tarentola bibronii*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-20 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**6-8 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Rupícola**
Hábitat	**Semidesierto y terreno rocoso**
Dificultad	**Principiante**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 40 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**24-28 °C**
Punto caliente	**30-33 °C**
Temperatura, noche	**19-23 °C**
Humedad	**30-50 %**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario, en pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Puestas por año	**2-6**
Incubación	**45-60 días** a 27-28 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un animal adulto o una pareja necesita un terrario de al menos 60 × 40 × 40 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande, mejor.
TEMPERATURA	La especie se desenvuelve con un calor normal, siempre que una parte del terrario esté más caliente que el resto.
HUMEDAD Y AGUA	La especie es propia de regiones áridas, y el terrario debe ser seco y bien ventilado, con una humedad de alrededor del 30-50 %.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es nocturna y no necesita UVB si los insectos se espolvorean con calcio y vitamina D3, pero muchos animales en cautividad se asolean de buen grado bajo una luz tenue.
ALIMENTACIÓN	Este gecko es insectívoro y come casi todo lo que puede dominar.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es territorial y los machos adultos pelean, a menudo hasta perder dedos o trozos de piel. Por eso nunca deben mantenerse machos juntos.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Sudáfrica, Namibia y Botsuana.