herpy

GECKOS

Pegu bent-toed gecko

Cyrtodactylus peguensis

Un gecko nocturno de Myanmar, Tailandia y el oeste de Malasia, conocido por los bosques de Pegu. Existen muy pocos datos fiables sobre su mantenimiento, por lo que esta guía se basa en la experiencia con otras especies del género y debe tomarse como un punto de partida prudente.

Familia: Gekkonidae Nombre anterior: *Gymnodactylus peguensis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**7 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**8-10 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**60 × 40 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**23-27 °C**
Temperatura, noche	**20-23 °C**
Humedad	**60-90 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**90-150 días** a 22-25 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Sobre la especie

Cyrtodactylus peguensis es un gecko de tamaño mediano y cuerpo esbelto del género *Cyrtodactylus*. El nombre del género significa "dedo curvado" y alude a los dedos ligeramente arqueados. La especie fue descrita en 1893 por George Albert Boulenger a partir de ejemplares recogidos en Palon, en la región de Pegu, en el sur de Myanmar, y el nombre científico hace referencia a este lugar. Originalmente se llamaba *Gymnodactylus peguensis*.

La longitud máxima registrada del hocico a la cloaca es de 70 mm, de modo que los adultos miden unos 7 cm sin la cola. La longitud total con la cola no está documentada. La especie se distingue de otras del mismo grupo por una combinación de recuentos de escamas, entre ellos el número de poros en los machos, y no solo por el color, así que un ejemplar debería ser identificado por alguien que conozca el género.

La taxonomía ha sufrido cambios. Una antigua subespecie, *C. peguensis zebraicus*, es desde 2018 una especie independiente, *Cyrtodactylus zebraicus*, y no está estrechamente emparentada con *C. peguensis*. La información antigua sobre mantenimiento y cría suele usar el nombre anterior, por lo que puede referirse a una especie o a la otra. Los ejemplares del sur de Tailandia se atribuyen a veces a *C. zebraicus* y no a *C. peguensis*.

El temperamento, las variantes de color y la longevidad no están documentados para la especie, y los 8-10 años de la ficha son una estimación. El género tiene fama de ser tímido y rápido, y conviene dar por hecho lo mismo aquí.

Distribución y hábitat

Cyrtodactylus peguensis se ha citado en Myanmar (región de Pegu y Tenasserim), Tailandia y el oeste de Malasia. La localidad tipo es Palon, en la región de Pegu. La especie también se ha mencionado en la India, pero se considera un error.

La distribución en Tailandia y en la península malaya no está clara, porque las poblaciones del sur se atribuían antes a la subespecie *zebraicus*, que ahora es una especie independiente. En el mapa pueden aparecer registros de animales en cautividad o de ejemplares mal identificados.

> **Área de distribución natural:** Myanmar (Birmania), Tailandia y Malasia.

HÁBITAT

No existe una descripción detallada de *Cyrtodactylus peguensis* en la naturaleza. Se considera un gecko de bosque, y sus parientes de la península malaya viven en bosque de tierras bajas junto a cursos de agua y en bosque pantanoso.

El clima de su área de distribución es tropical, con una estación de lluvias y una seca bien marcadas, pero las temperaturas y altitudes exactas no están documentadas para la especie. Como hipótesis de trabajo, el terrario debe tener un diseño húmedo, similar al bosque, con la posibilidad de elegir entre zonas húmedas y otras algo más secas. El biotopo de la ficha es una estimación.

Cuidados

EL TERRARIO

El mantenimiento de *Cyrtodactylus peguensis* no está descrito, por lo que esta guía se basa en especies emparentadas del género y en las necesidades de los geckos nocturnos trepadores de zonas húmedas. Un adulto necesita como mínimo 60 × 40 × 60 cm (largo × ancho × alto), y una pareja algo más. Cuanto más grande, mejor, porque la especie es activa y caza de noche.

Ambienta el terrario con un sustrato húmedo de fibra de coco o turba, zonas con sphagnum, ramas, corteza de alcornoque y plantas, de modo que el animal pueda moverse por el suelo y trepar a poca altura. Ofrece siempre al menos dos refugios, uno cerca del suelo y otro más arriba, porque las especies del género necesitan sentirse seguras. Unos pequeños orificios en los laterales proporcionan ventilación sin secar del todo el sustrato. La especie tiene la piel delicada, así que evita objetos afilados y grietas estrechas donde pueda quedar atrapada.

TEMPERATURA

De día debe haber 23-27 °C y de noche 20-23 °C, como en especies emparentadas de bosque húmedo.

No se ha documentado la necesidad de una zona cálida de calentamiento, y la especie no es conocida por tomar el sol. Una manta térmica suave en un lateral puede ayudar si la habitación es fría, pero contrólala siempre con un termostato. Observa al animal: si se esconde constantemente o rechaza la comida, la temperatura puede ser incorrecta. Mide tanto en la parte alta como en la baja.

Leer más: Calor y temperatura

HUMEDAD Y AGUA

Cyrtodactylus peguensis probablemente depende de una humedad ambiental alta. Mantenla en 60-90 %, con el máximo por la noche.

Pulveriza el terrario al menos una vez al día y deja que la superficie se seque un poco entre pulverizaciones para que no aparezca moho. Mantén una capa de sustrato permanentemente húmedo, por ejemplo sphagnum, donde el animal pueda refugiarse. Coloca un cuenco bajo con agua fresca, que se cambie a diario. Algunas especies del género se meten en el agua, así que el cuenco debería ser lo bastante grande para que el animal quepa en él. No está documentado si *C. peguensis* lo hace.

Leer más: Humedad, nebulización y ventilación

ILUMINACIÓN Y UVB

Cyrtodactylus peguensis es nocturna y se conforma con una iluminación tenue. No es imprescindible el UVB, pero una luz UVB débil es una ventaja.

Si ofreces UVB, elige una fuente débil pensada para animales de sombra y colócala de manera que una parte del terrario quede siempre en sombra y el animal pueda retirarse. Mantén un ciclo diario fijo con unas 12 horas de luz y asegura oscuridad total por la noche. Hay que evitar los focos potentes.

Leer más: Luz y UVB

ALIMENTACIÓN

Cyrtodactylus peguensis es insectívora. Ofrece grillos, cucarachas dubia e insectos similares que sean más pequeños que la distancia entre los ojos del animal. Las especies grandes del género también toman presas mayores, pero eso no es relevante para una especie de unos 7 cm.

Los adultos se alimentan unas tres veces por semana y las crías con más frecuencia. Espolvorea los insectos con calcio, alternando con calcio con vitamina D3, y con más frecuencia en el caso de las hembras que ponen huevos. Alimenta por la tarde-noche, cuando el animal está activo, y retira los insectos muertos. Conviene esparcir la comida para que el animal pueda cazar.

Leer más: Presas vivas: cría y manejo Leer más: Calcio, vitaminas y suplementos

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El género tiene fama de ser tímido y rápido, y de tener la piel fina y delicada, que se desgarra con facilidad. Si se le sujeta, puede morder. Por eso se desaconseja manipularlo, y un animal debe tener siempre tiempo para adaptarse tras un traslado. Si tienes que cogerlo, déjalo caminar de una mano a otra y evita apretarlo.

Las especies del género suelen ser territoriales, por lo que *C. peguensis* se mantiene mejor en solitario. Se puede probar con una pareja si el terrario es grande y tiene muchos refugios, pero no todas las parejas son compatibles, y hay que separar a los animales de inmediato ante cualquier signo de agitación. Nunca mantengas juntos a dos machos. No está documentado cómo se comporta exactamente *C. peguensis* en grupo.

Cría

MADUREZ SEXUAL Y SEXADO

Las diferencias entre sexos en *Cyrtodactylus peguensis* no están descritas en detalle. Los machos tienen 8 poros delante de la cloaca y 17-19 poros en los muslos, por lo que se pueden reconocer con una lupa. En las hembras los poros faltan o están poco desarrollados.

La madurez sexual y el peso no están documentados para la especie. Como regla general para geckos de este tamaño, los animales deberían tener al menos 18 meses antes de juntarlos, y la hembra debe estar en buena condición corporal.

APAREAMIENTO

Hay poca experiencia con la cría de la especie en cautividad, y la época y el periodo de reposo no están documentados. Las especies emparentadas se reproducen a temperatura ambiente todo el año, sin un descanso invernal marcado.

Introduce al macho en el terrario de la hembra y observa a los animales los primeros días. Sepáralos si hay mordiscos, persecución o una hembra que se esconde todo el tiempo. Muchas parejas no son compatibles, y una pareja que no quiere reproducirse no debe forzarse.

PUESTA Y NIDADAS

La especie es ovípara. El tamaño de la puesta no está documentado, pero las especies del género casi siempre ponen 1-2 huevos, y esa es la cifra de la ficha. Es probable que la hembra deposite los huevos ocultos en el sustrato, bajo un refugio.

Ofrece una caja de puesta con sphagnum húmedo o fibra de coco. El intervalo entre puestas no está documentado. La hembra consume mucho calcio, así que ofrece insectos espolvoreados con calcio y, si quieres, pequeños trozos de jibión, y interrumpe la cría si pierde peso.

INCUBACIÓN

Traslada los huevos con cuidado, sin girarlos, a una caja pequeña con sustrato ligeramente húmedo, por ejemplo vermiculita o perlita, y entiérralos hasta la mitad. Incuba los huevos a 22-25 °C, la temperatura ambiente fresca a la que se mantienen los parientes, y no por encima de 26 °C.

Los huevos eclosionan tras unos 90-150 días. La temperatura de incubación y el tiempo hasta la eclosión no están documentados para la especie, así que las cifras son estimaciones. Ten paciencia y no deseches huevos que parezcan sanos.

Leer más: Incubación de huevos

CRIANZA DE LOS JUVENILES

No hay experiencias documentadas con la cría de juveniles de *Cyrtodactylus peguensis*. Probablemente las crías se pueden mantener como los adultos, en una versión más pequeña del montaje.

Trasládalas a una caja pequeña con papel de cocina o sphagnum húmedo y refugios, y pulveriza a diario. Ofrece insectos pequeños espolvoreados con calcio, como colémbolos, moscas de la fruta y grillos pequeños, en cuanto los animales coman. Mantén separadas las crías si muestran signos de comportamiento territorial, y pésalas con regularidad.

Salud y errores frecuentes

No hay conocimiento específico sobre enfermedades en *Cyrtodactylus peguensis*. Los problemas típicos en especies del género y en otros geckos en cautividad son:

- Aire seco y sustrato seco, que provocan problemas de piel y restos de muda en los dedos. Asegura zonas húmedas y pulveriza a diario.
- Deficiencia de calcio, sobre todo en hembras ponedoras. Espolvorea la comida y ofrece calcio.
- Parásitos en animales capturados en la naturaleza. Conviene hacer un análisis de heces en un veterinario con experiencia en reptiles.
- Estrés por manipulación y escasez de refugios, que provoca rechazo de la comida y pérdida de peso.
- Heridas tras peleas, si los animales se mantienen juntos.

Acude al veterinario si el animal pierde peso, no come durante varias semanas o parece apático.

Leer más: Comprar animales: cría en cautividad, captura silvestre y transporte

Pregunta siempre a quien sepa

Esta guía es un buen punto de partida, pero no puede sustituir a la experiencia. Cada animal es distinto, y gran parte de lo más importante se aprende de personas que llevan años criando la especie. Habla con un criador, un aficionado con experiencia o un veterinario que conozca los reptiles y anfibios antes de hacerte con el animal, y otra vez si algo no parece normal.