herpy

GECKOS

Ebenavia boettgeri

Ebenavia boettgeri es un gecko pequeño y esbelto de las selvas tropicales de tierras bajas de la costa oriental de Madagascar, de unos 6-8 cm incluida la cola. Durante muchos años se consideró parte de *Ebenavia inunguis* y solo desde 2018 vuelve a ser una especie independiente. Se sabe poco sobre su mantenimiento.

Familia: Gekkonidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**6-8 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-8 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**30 × 30 × 30 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**26-28 °C**
Temperatura, noche	**18-22 °C**
Humedad	**70 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**60-90 días** a 24-27 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Se sabe poco sobre el mantenimiento de *Ebenavia boettgeri*. Las cifras de esta guía se han tomado de *Ebenavia inunguis*, el pariente más cercano y mejor conocido, y concuerdan con el clima de su área de distribución.

TEMPERATURA

De día, el terrario debe mantenerse a 26-28 °C. Por la noche la temperatura baja a unos 22 °C en verano y 18 °C en invierno. Un tubo fluorescente suele dar calor suficiente.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad del aire debe rondar el 70 %. Es fácil de mantener pulverizando el terrario una vez al día, preferiblemente por la tarde, de modo que las hojas y la corteza queden húmedas.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es nocturna y se esconde durante el día. El terrario se ilumina y calienta con un tubo fluorescente, encendido 12 horas al día en verano y 10 horas en invierno, controlado con un temporizador. El UVB es opcional.

ALIMENTACIÓN

Ofrece insectos pequeños y otros artrópodos pequeños, más pequeños que la cabeza del animal: moscas de la fruta, colémbolos, grillos recién nacidos y pequeños, y cochinillas pequeñas.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Ebenavia boettgeri es lenta y sigilosa y no es apta para la manipulación. Los animales que se intenta coger pueden huir y soltar la cola, que no vuelve a crecer con la misma forma.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Madagascar.