herpy

GECKOS

Bauer's chameleon gecko

Eurydactylodes agricolae

Eurydactylodes agricolae es una trepadora pequeña y esbelta de los bosques del noroeste de Nueva Caledonia, de piel granulosa de color verde oliva a verde musgo y con marcas amarillas junto a la boca y en las extremidades. Tolera mal el calor, pero no es difícil de mantener en un terrario fresco, húmedo y densamente plantado.

Familia: Diplodactylidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**5-6 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día y al crepúsculo**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**30 × 30 × 45 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**18-24 °C**
Temperatura, noche	**16-20 °C**
Humedad	**60-90 %**
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos y alimento completo**
Se mantiene	**En solitario, en pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**18-36 meses**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Puestas por año	**5-7**
Incubación	**60-120 días** a 22-25 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Casi amenazada (NT)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un ejemplar adulto de *Eurydactylodes agricolae* o una pareja pueden mantenerse en un terrario de al menos 30 × 30 × 45 cm (largo × ancho × alto), y más alto siempre es mejor.
TEMPERATURA	*Eurydactylodes agricolae* procede de bosques con temperatura moderada y tolera mal el calor. Mantén 18-24 °C durante el día; los animales se desenvuelven bien a temperatura ambiente normal.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental de *Eurydactylodes agricolae* debe ser de moderada a alta y oscilar a lo largo del día. Apunta a un 60-70 % durante el día y un 80-90 % tras la pulverización de la tarde.
ILUMINACIÓN Y UVB	*Eurydactylodes agricolae* es activa de día y al crepúsculo, y le gusta tomar el sol bajo la luz UVB. Ofrece un ciclo diario fijo con 10-14 horas de luz. La UVB no es estrictamente necesaria.
ALIMENTACIÓN	La base de la alimentación de *Eurydactylodes agricolae* es una dieta en polvo ya preparada para geckos frugívoros de Nueva Caledonia, que se mezcla hasta formar una papilla fluida.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Eurydactylodes agricolae* es pequeña, rápida y frágil, y sobre todo un animal para observar. Con paciencia puede acostumbrarse a una manipulación breve y tranquila.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Nueva Caledonia.