herpy

GECKOS

Western chameleon gecko

Eurydactylodes occidentalis

Eurydactylodes occidentalis es la especie más pequeña del género de los gecos camaleón de Nueva Caledonia: un geco arborícola pequeño, de hábitos nocturnos y con cola prensil, que solo vive en las tierras bajas costeras de la vertiente occidental de Grande Terre. La especie se describió por primera vez en 2009, está amenazada en la naturaleza y rara vez se ve en cautividad. Los cuidados se basan en los de sus parientes *Eurydactylodes vieillardi* y *Eurydactylodes agricolae*.

Familia: Diplodactylidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**5 cm** longitud hocico-cloaca
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Bosque seco**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**22-26 °C**
Punto caliente	**27-29 °C**
Temperatura, noche	**20-23 °C**
Humedad	**60-80 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos, fruta y alimento completo**
Se mantiene	**En solitario, en pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**50-90 días** a 22-26 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**En peligro (EN)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Se sabe poco sobre los cuidados de *Eurydactylodes occidentalis*. Las cifras se han tomado de *Eurydactylodes vieillardi* y *Eurydactylodes agricolae*, que tienen un modo de vida y un tamaño casi iguales.
TEMPERATURA	Durante el día debe haber 22-26 °C en la mayor parte del terrario y una zona cálida bajo una lámpara de 27-29 °C. Por la noche la temperatura debe bajar a 20-23 °C.
HUMEDAD Y AGUA	Mantén la humedad ambiental en 60-80 %, medida en el centro del terrario. Es más baja en el extremo cálido y más alta en el fresco. Debe subir por la noche y bajar a lo largo del día, pero nunca por debajo del 50 %.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es nocturna y puede arreglárselas sin UVB cuando el alimento contiene vitamina D3, pero una luz UVB suave es una ventaja.
ALIMENTACIÓN	Es probable que la especie se alimente de fruta e insectos, como el resto del género.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Eurydactylodes occidentalis* es pequeño y tranquilo, y las especies del género pueden acostumbrarse a una manipulación breve. Deja que un ejemplar nuevo tenga dos semanas de calma y manipúlalo solo si ha comido.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Nueva Caledonia.