herpy

GECKOS

Wiegmann's striped gecko

Gonatodes vittatus

Un gecko pequeño y diurno de Venezuela, Colombia y las islas cercanas a la costa, en el que el macho presenta una franja blanca con borde negro a lo largo del dorso y la cabeza amarilla. Trepa por troncos y muros, pero no puede subir por el cristal, y se adapta bien a un terrario pequeño si se mantiene solo o en pareja.

Familia: Sphaerodactylidae Nombre anterior: *Gymnodactylus vittatus; Gonatodes gillii*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**7-8 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-20 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Bosque seco**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**30 × 30 × 30 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**24-27 °C**
Punto caliente	**29-32 °C**
Temperatura, noche	**20-24 °C**
Humedad	**50-60 %**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Insectos y pequeños invertebrados (colémbolos, moscas de la fruta)**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1 huevos**
Incubación	**65-110 días** a 25-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Una pareja necesita un terrario de al menos 30 × 30 × 30 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande, mejor, porque más espacio aporta más tranquilidad.
TEMPERATURA	De día debe haber 24-27 °C en el terrario. Se puede crear una zona cálida de 29-32 °C con una manta térmica o una lámpara, pero no es necesario si la temperatura general es alta y estable.
HUMEDAD Y AGUA	*Gonatodes vittatus* prospera en un aire más seco que la mayoría de los geckos tropicales. Mantén la humedad ambiental en 50-60 %.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna, pero no toma el sol, y los UVB son opcionales. Una luz UV débil puede facilitar la reproducción, pero un exceso de UV puede causar problemas con la muda.
ALIMENTACIÓN	*Gonatodes vittatus* come insectos y otros artrópodos pequeños.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	La especie es atrevida y curiosa y se ve a menudo de día, pero no es un animal para manipular. La piel puede desgarrarse si se agarra al animal, y los ejemplares se estresan con facilidad.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Colombia, Venezuela, Guyana, Trinidad y Tobago, Aruba y Curazao.