herpy

GECKOS

Common house gecko

Hemidactylus frenatus

Hemidactylus frenatus es un gecko robusto y nocturno del sur y el sudeste de Asia que ha viajado en barcos y cargamentos por todos los trópicos y hoy vive en las casas de buena parte del mundo. Trepa por superficies verticales, caza insectos bajo las lámparas y emite un reclamo agudo, parecido a un chasquido repetido. En terrarios es poco frecuente y es más conocido como especie invasora.

Familia: Gekkonidae Nombre anterior: *Hemidactylus vittatus; Hemidactylus okinawensis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**8-15 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-8 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Arborícola y rupícola**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 30 × 40 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**25-30 °C**
Punto caliente	**30-32 °C**
Temperatura, noche	**22-25 °C**
Humedad	**50-70 %**
UVB	**Opcional**
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**6-12 meses**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**46-62 días** a 28-30 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**No evaluada (NE)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un único ejemplar adulto de *Hemidactylus frenatus* necesita un terrario de al menos 40 × 30 × 40 cm (largo × ancho × alto). Una pareja necesita al menos 60 × 40 × 40 cm con muchos escondites.

TEMPERATURA

Mantén 25-30 °C en el terrario durante el día y 22-25 °C por la noche.

HUMEDAD Y AGUA

Mantén una humedad ambiental de alrededor del 50-70 % y pulveriza el terrario ligeramente una vez al día, preferiblemente por la tarde, de modo que haya rocío en hojas y piedras. La humedad debe poder bajar a lo largo del día.

ILUMINACIÓN Y UVB

Hemidactylus frenatus es activo al anochecer y por la noche, y no existe ninguna recomendación documentada de UVB.

ALIMENTACIÓN

En la naturaleza, *Hemidactylus frenatus* es un cazador versátil. Los insectos y las arañas constituyen la mayor parte de la dieta: cucarachas, termitas, moscas, polillas, escarabajos, abejas y avispas.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Hemidactylus frenatus es rápido, nervioso y no se debe manipular. Puede morder si está estresado, pero el mordisco es bastante débil e inofensivo para las personas.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

India, Sri Lanka, Bangladés, Myanmar (Birmania), Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas.