herpy

GECKOS

Banded velvet gecko

Homopholis fasciata

Un gecko robusto, de piel aterciopelada, de las sabanas de África oriental, con bandas oscuras sobre el dorso y tanto lamelas adhesivas como garras en los dedos. Es sobre todo nocturno, se esconde en huecos de árboles grandes y se hace el muerto cuando se siente amenazado. Los cuidados solo están descritos a grandes rasgos.

Familia: Gekkonidae Nombre anterior: *Platypholis fasciata; Homopholis erlangeri*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**9-11 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**8-12 años**
Activo	**Al crepúsculo y de noche**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Sabana**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**40 × 40 × 60 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**24-28 °C**
Punto caliente	**28-32 °C**
Temperatura, noche	**19-24 °C**
Humedad	**60-80 %**
UVB	**Opcional**
Reposo invernal	**19-23 °C** 12-16 semanas
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En pareja o un macho con varias hembras**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**2 huevos**
Puestas por año	**4-5**
Incubación	**60-80 días** a 26-29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Homopholis fasciata es trepadora, así que una pareja necesita un terrario alto de al menos 40 × 40 × 60 cm (largo × ancho × alto). Más grande siempre es mejor, sobre todo si mantienes más de dos animales.

TEMPERATURA

De día la temperatura debe situarse entre 24 y 28 °C, y debe haber una zona más cálida de 28-32 °C, por ejemplo bajo una pequeña bombilla halógena de 10-20 W o sobre una manta térmica.

HUMEDAD Y AGUA

La humedad ambiental debe ser de moderada a alta, 60-80 %, con un gradiente de un extremo del terrario al otro.

ILUMINACIÓN Y UVB

La especie es activa al anochecer y de noche, y puede verse a la luz del día, pero se oculta a la sombra a mediodía. Usa una luz para plantas normal con temporizador, 12 horas encendida y 12 apagada.

ALIMENTACIÓN

El alimento principal son grillos, complementados con cucarachas, gusanos de la harina y otros insectos de tamaño adecuado para variar la dieta. De vez en cuando pueden darse larvas de la polilla de la cera.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Homopholis fasciata puede morder y aferrarse, y se hace el muerto y suele quedarse inmóvil cuando tiene miedo, así que no la manipules sin motivo. Da tiempo a los animales nuevos para que se aclimaten.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Etiopía, Kenia, Somalia y Tanzania.