herpy

GECKOS

Cameroon dwarf gecko

Lygodactylus conraui

Un pequeño trepador diurno de los bosques de África occidental y el único gecko verde de la región. Se posa sobre troncos, hojas de palmera y muros de casas en los bordes de bosque sombríos. Es raro en terrarios, y su cuidado se basa en el de gecos enanos diurnos muy emparentados.

Familia: Gekkonidae

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**7-9 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**5-8 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Selva tropical**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**30 × 30 × 45 cm** L × An × Al para 2 adultos
Temperatura, día	**24-27 °C**
Punto caliente	**32-34 °C**
Temperatura, noche	**21-24 °C**
Humedad	**60-80 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 2
Alimentación	**Insectos, néctar y alimento completo**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**4-8 meses**
Tamaño de la puesta	**2 huevos**
Incubación	**60-120 días** a 24-28 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	El cuidado de *Lygodactylus conraui* se basa en el de la muy emparentada *Lygodactylus williamsi* y en el modo de vida de la especie en la naturaleza.
TEMPERATURA	*L. conraui* vive en tierras bajas cálidas y húmedas. De día debe haber 24-27 °C con un punto de calor de 32-34 °C, al que el animal pueda acudir y que pueda abandonar.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad ambiental debe estar en el 60-80 %, más alta en la parte inferior.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y necesita una luz intensa de espectro completo. Usa tubos fluorescentes T5, uno de luz diurna de unos 6500 K y otro con UVB.
ALIMENTACIÓN	En la naturaleza la especie se alimenta de artrópodos muy pequeños, sobre todo mariposas pequeñas y termitas.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	*Lygodactylus conraui* es un animal para observar, no para coger con la mano. Los gecos enanos son pequeños, rápidos y frágiles, y la manipulación los estresa y puede costarles la cola.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Sierra Leona, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún y Guinea Ecuatorial.