herpy

GECKOS

## Mossy New Caledonian gecko

# *Mniarogekko chahoua*

Un gecko trepador grande, de moteado musgoso y hábitos nocturnos, procedente de los bosques húmedos de las tierras bajas de Nueva Caledonia, con el hocico corto y ancho y una cola prensil robusta. Es uno de los más bellos entre los grandes geckos neocaledonios, pero exige más espacio y más paciencia que su célebre pariente *Correlophus ciliatus*.

Familia: Diplodactylidae  Nombre anterior: *Rhacodactylus chahoua; Platydactylus chahoua*

### DATOS CLAVE

#### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **25-31 cm**<br>longitud total con la cola |
| Peso | **50-60 g** |
| Esperanza de vida | **15-20 años** |
| Activo | **De noche** |
| Modo de vida | **Arborícola** |
| Hábitat | **Selva tropical** |
| Dificultad | **Intermedio** |

#### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **60 × 60 × 90 cm**<br>L × An × Al para 1 adulto |
| Temperatura, día | **22-26 °C** |
| Punto caliente | **27-29 °C** |
| Temperatura, noche | **18-22 °C** |
| Humedad | **60-80 %** |
| UVB | **Recomendado**<br>Zona Ferguson 1 |
| Alimentación | **Insectos, fruta y alimento completo** |
| Se mantiene | **En solitario o un macho con varias hembras** |

#### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Ovípara** |
| Madurez sexual | **15-24 meses** |
| Tamaño de la puesta | **2 huevos** |
| Puestas por año | **3-5** |
| Incubación | **60-120 días**<br>a 22-26 °C |

#### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **No incluida** |
| Anexo de la UE | **No incluida** |
| UICN | **Vulnerable (VU)** |

## Cuidados de un vistazo

| | |
|---|---|
| **EL TERRARIO** | Un ejemplar adulto necesita un terrario alto de al menos 60 × 60 × 90 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande, mejor. La altura es más importante que la superficie del suelo. |
| **TEMPERATURA** | De día debe haber 22-26 °C en el terrario, y una zona de descanso en lo alto bajo una bombilla de calor suave puede alcanzar 27-29 °C, preferiblemente en el extremo bajo. De noche son adecuados 18-22 °C. |
| **HUMEDAD Y AGUA** | Mantén una humedad del 60-80 %, medida en el centro del terrario, y que sea más alta por la noche. Pulveriza a fondo con agua tibia cada tarde y por la mañana según haga falta. |
| **ILUMINACIÓN Y UVB** | La especie es nocturna y puede sobrevivir sin UVB si recibe vitamina D3 a través del alimento, pero se desarrolla mejor con una luz UVB débil. |
| **ALIMENTACIÓN** | *Mniarogekko chahoua* es omnívoro. La base de la dieta es una papilla en polvo preparada para geckos frugívoros, mezclada con agua hasta obtener una pasta espesa y servida en una repisa en lo alto, complementada con insectos vivos. |
| **COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN** | *Mniarogekko chahoua* es tímido y saltarín de joven y suele volverse más tranquilo con la edad. Tiene una mordedura fuerte y un agarre firme. Deja a los animales nuevos dos semanas en paz antes de empezar a manipularlos. |
| **ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL** | Nueva Caledonia. |