herpy

GECKOS

Northern velvet gecko

Oedura castelnaui

Oedura castelnaui es un trepador aplanado y de hábitos nocturnos que vive en bosques abiertos y sabanas del norte de Queensland, sobre todo en la península del Cabo York. Durante el día permanece oculto y sale cuando cae la noche. Su cuidado y su cría se basan en gran medida en la experiencia con las demás especies del género.

Familia: Diplodactylidae Nombre anterior: *Phyllodactylus castelnaui; Oedura mayeri*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**15-20 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De noche**
Modo de vida	**Arborícola y terrestre**
Hábitat	**Sabana**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**45 × 45 × 60 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**24-28 °C**
Punto caliente	**30-32 °C**
Temperatura, noche	**20-24 °C**
Humedad	**40-70 %**
UVB	**Opcional** Zona Ferguson 1
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**1-2 huevos**
Incubación	**60-75 días** a 26-29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**No incluida**
Anexo de la UE	**No incluida**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un solo adulto de *Oedura castelnaui* necesita un terrario alto de al menos 45 × 45 × 60 cm (largo × ancho × alto). Una pareja necesita algo más, por ejemplo 60 × 45 × 60 cm.

TEMPERATURA

Mantén la temperatura diurna en 24-28 °C y deja una pequeña zona que alcance 30-32 °C, por ejemplo bajo una lámpara baja o una manta térmica en un lateral. Por la noche la temperatura puede bajar a 20-24 °C.

HUMEDAD Y AGUA

Mantén la humedad del aire en torno al 40-60 %, con una subida breve hasta cerca del 70 % tras pulverizar por la tarde. Deja que el terrario se seque a lo largo del día.

ILUMINACIÓN Y UVB

Oedura castelnaui es nocturna y el UVB no es imprescindible. Aun así, una luz UVB débil es una opción razonable, siempre que también haya sombra.

ALIMENTACIÓN

Oedura castelnaui se alimenta de insectos. Ofrece presas vivas de tamaño adecuado: grillos, cucarachas dubia, saltamontes y de vez en cuando gusanos de la harina o larvas de la polilla de la cera.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Como otras especies de *Oedura*, *Oedura castelnaui* probablemente es tranquila, pero esquiva y rápida, y se escabulle enseguida si se la sujeta. No la cojas más de lo necesario.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Australia.