herpy

GECKOS

## Gargoyle gecko

# *Rhacodactylus auriculatus*

Un trepador robusto y tranquilo de los matorrales de Nueva Caledonia, con pequeñas protuberancias en la parte posterior de la cabeza que recuerdan a una pequeña gárgola gótica y una cola prensil capaz de agarrarse a las ramas. Tolera la temperatura ambiente de una vivienda, se alimenta de papilla preparada e insectos y es una buena elección para quien busque un gecko resistente, con algo más de peso y personalidad.

Familia: Diplodactylidae  Nombre anterior: *Platydactylus auriculatus; Ceratolophus hexaceros*

DATOS CLAVE

### EL ANIMAL

| | |
|---|---|
| Tamaño adulto | **18-23 cm**<br>longitud total con la cola |
| Peso | **35-70 g** |
| Esperanza de vida | **15-20 años** |
| Activo | **Al crepúsculo y de noche** |
| Modo de vida | **Arborícola** |
| Hábitat | **Selva tropical y bosque de montaña** |
| Dificultad | **Principiante** |

### CUIDADOS

| | |
|---|---|
| Terrario mín. | **45 × 45 × 60 cm**<br>L × An × Al para 1 adulto |
| Temperatura, día | **22-27 °C** |
| Punto caliente | **26-28 °C** |
| Temperatura, noche | **18-22 °C** |
| Humedad | **50-80 %** |
| UVB | **Recomendado**<br>Zona Ferguson 1 |
| Alimentación | **Insectos, fruta y alimento completo** |
| Se mantiene | **En solitario o un macho con varias hembras** |

### CRÍA

| | |
|---|---|
| Reproducción | **Ovípara** |
| Madurez sexual | **15-24 meses** |
| Tamaño de la puesta | **2 huevos** |
| Incubación | **60-90 días**<br>a 22-27 °C |

### PROTECCIÓN Y TRÁMITES

| | |
|---|---|
| CITES | **No incluida** |
| Anexo de la UE | **Anexo D** |
| UICN | **Preocupación menor (LC)** |

## Cuidados de un vistazo

| | |
|---|---|
| EL TERRARIO | Un adulto necesita un terrario de al menos 45 × 45 × 60 cm (largo × ancho × alto). |
| TEMPERATURA | De día debe haber 22-27 °C en el terrario, y una pequeña zona en la parte superior puede llegar a 26-28 °C. Por la noche la temperatura debe bajar a 18-22 °C y, en invierno, el animal tolera noches de hasta 16-18 °C. |
| HUMEDAD Y AGUA | La humedad ambiental debe oscilar entre el 50 y el 80 % aproximadamente. Pulveriza el terrario por la tarde para que la humedad suba al 70-80 % y deja que baje a un 50-60 % durante el día, de modo que el sustrato pueda secarse. |
| ILUMINACIÓN Y UVB | La especie es activa al anochecer y por la noche y puede prescindir de UVB si la dieta contiene vitamina D3. |
| ALIMENTACIÓN | La base de la alimentación es una papilla en polvo preparada para geckos frugívoros, mezclada con agua hasta obtener una pasta espesa. |
| COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN | *Rhacodactylus auriculatus* es tranquilo y puede llegar a ser bastante manso, y la mayoría de los animales toleran bien la manipulación. |
| ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL | Nueva Caledonia. |

La guía completa con mapa y actualizaciones: herpy.org/es/geckos/rhacodactylus-auriculatus